

南の風だより 1月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155



センター長	荻野	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	栗田・池田亜沙美	水稲・野菜・莓	山森・海野・池田里奈	配送員	増井・松風・正込

バレイショ

1. 植付け

- (1) 種イモ量：30～40gの種いも×500個/1a(15～18kg/1a)
- (2) 植付間隔 普通栽培(3月上～下旬植え)：うね幅60cm×株間30cmの1条植え
早期マルチ栽培(2月上旬植え)：うね幅120cm×株間30cmの2条植え

灰の代わりに…『じゃがいもシカ』… **¥432(500g 約100個～150個分)**

- ・切り口保護のほか発芽促進が期待される資材です
- ・石灰の代わりに切り口によく付着させてください。

2. 施肥

普通栽培では、草丈10cm頃に大きく太い芽を2本残しかき取り、追肥と土寄せを行う。二回目の土寄せは、草丈20～25cm頃に実施する。マルチ栽培の場合には全量元肥施用とする。

3. 病害虫防除

そうか病	フロンサイド粉剤	30～40kg/10a	植付前
センチュウ・アブラムシ類	ネマトリンエース粒剤	20～25kg/10a	植付前
ネキリムシ・ケラ	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	植付前

そうか病対策！（イモの肌がカサブタ状になる症状）

- ・連作、過作を避ける
- ・アルカリ性土壌で多発→石灰資材の過用は避ける。
- ・未熟な堆肥を避け、完熟堆肥を施用する
- ・土壌の乾燥を防ぐ

さやえんどう（キヌサヤ・スナック）

1回目の追肥は開花期～着莢期に行う。開花後の肥切れは不良莢を多くし減収の原因となるので注意が必要です。

ハダカリバI類・アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日～2回
うどんこ病	サンヨール乳剤	500倍	前日～4回
	ラリー水和剤	4,000～8,000倍	前日～3回

タマネギ

灰色腐敗病	ジマンダイセン水和剤	500倍	3日～5回
べと病・白色疫病	リトシジールMZ水和剤	1,000倍	7日～3回
アザミウマ類	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日～2回

ハウレンソウ

べと病は黄色の斑点と葉裏の灰色のかびが目印。病気の葉を取り除いてから発生場所を中心に薬剤をかけて防ぎましょう。

べと病	アリエッティ水和剤	1,500倍	前日～2回
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日～2回

柑橘

1. 土壌改良資材投入

2月	苦土セルカ	200kg/10a
----	-------	-----------

※ 樹勢が落ちているときは堆肥等の有機物を投入する。

2. 防除

マシン油の散布は1月中旬までとし、花芽をつくる1月下旬～2月は散布しないこと。

3. 間伐・剪定

2月～3月に間伐・せん定を実施し、受光量を多くして品質向上・安定生産に努める。

☆ 剪定後、大きい切り口にはトップジンMペーストを塗布する。

4. 収穫

スルガエレガントの収穫は1月中旬以降。雨後の寒気に注意し、目通りから収穫を行なう。内成り、裾成りは2月中・下旬に収穫すると品質が安定する。

☆柑橘・落葉果樹 剪定時期

果樹名	剪定時期	果樹名	剪定時期
温州・雑柑類・レモン	2月下旬～発芽前	ブドウ	1月～2月頃
いちじく（露地）	2月中旬～3月上旬頃	ブルーベリー	1月～発芽前
柿	1月～2月頃		



お知らせ

南部地区水稲栽培講習会

開催日：平成29年2月2日（木）14：00～

会場：JA静岡市本店 4階研修室1.2

内容：水稲栽培管理について 水稲農薬について

参加希望者は南部営農経済センターまでご連絡ください



茶★平成29年度

茶改植等補助事業及び茶から他作物への転換に伴う「茶樹抜根」国庫補助事業

・補助概要

対象期間 平成29年4月～平成30年3月に下記作業を行うもの

- ① 改植をする場合 29万3千円/10a
- ② 新植をする場合 12万円/10a
- ③ 新たに棚を設置する場合 14万円/10a
- ④ 地際（地上10cm程度）で台切りをする場合 7万円/10a
- ⑤ 茶から他作物へ転換する場合 5万円/10a

・申請方法

南部営農経済センター 小澤までご連絡ください。

実施する場所の現状の茶園写真

・期限 平成29年2月10日（金）

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。（普通物は、特に表記してありません。）

いちご

端境期となり、出荷量が減っている方が多いかと思えます。後半戦に向けて病害虫防除を！また、成り疲れで株が弱っている場合には微量要素肥料の葉面散布を行いましょう！

成り疲れ防止おすすめ資材 ⇒ **トレイン 500倍** を葉面散布
月に2回、農薬散布時に混合して使用してください



(1) 病害虫防除

① うどんこ病・灰色かび病 ※発病部位は除去し、圃場外へ持ち出す。

病害	薬剤	使用基準		備考
うどんこ病	ガッテン乳剤	5,000倍	前日-2回	
	トリフミンジェット	50g/400㎡	前日-5回	回数は水和剤と合算
灰色かび病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回	ボトル内での凝固に注意
	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	前日-3回	
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100㎡	前日-3回	床面積 50㎡×2m

くん煙剤を使って防除！ ⇒ 発生圃場ではくん煙剤を使ってハウス全体を殺菌しましょう！
煙は微粒子なので作物によく付着し、隅々まで拡散します。

ハダニ

発生が増えてきました！注意してください。

天敵は温かくなる2月下旬ごろからの放飼が望ましい。

害虫	薬剤	使用基準		入蜂	カブリダニ
ハダニ	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日-2回	1日	○
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日-2回	1日	○
アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日-3回	1日※	×

※マルハナバチには影響があります。

② アザミウマ類 春になって大発生する前に防除しておきましょう！

害虫	薬剤	使用基準		入蜂	カブリダニ
アザミウマ	マッチ乳剤	2,000倍	前日-4回	1日	○
	ボタニガード ES※	1,000倍	前日-回数なし	—	○


※微生物農薬のため、予約注文です。店舗に在庫はありません。

(2) ミツバチ ★全国的にミツバチが減っています★

九州と北海道の長雨等、本州のハチダニ発生の影響で、ミツバチの数が全国的に減っているため、今後のミツバチの価格高騰が予想されます。今いるミツバチを大切に管理しましょう！

- ・ミツバチの訪花活動温度は **18℃～25℃**。低温や **28℃以上にならないように注意する**
- ・厳寒期は巣箱の中の温度を下げないように、ハウス内に設置し、発砲スチロールで囲んだり、毛布でくるむなどする。
- ・餌は20日に1回程度、様子を見ながらおこなう（ハニークラフト 200ml/1回）

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。（普通物は、特に表記してありません。）



★平成28年分 確定申告に必要なもの★

昨年、国税庁HPで申告書類を作成した方は、申告書の代わりに納税者番号が掲載されたハガキが郵送されます。

1、収支決算書作成にあたり必要なもの

- ① 収入・経費を明確にし、仕分けする。（科目は先月号に掲載しています。）
- ② 減価償却費（固定資産台帳）
※新規登録などで修正したものは今月の訪問日で配布させていただきます。
- ③ 昨年の決算書の控え

2、申告書作成にあたり必要なもの

- ① マイナンバーカード
マイナンバーカードがない方は…
通知カードまたは住民票の写し と身元証明書類（免許・保険証・年金手帳等）
- ② 所得を証明する書類等の準備
※作成した収支決算書（農業・不動産・一般）・給与、年金の源泉徴収票 等
- ③ 国民健康保険料納付書又は口座振替明細のハガキ
※電話での問い合わせができないので、事前に準備をしてください。
※年をまたいで記載されているので、過去2年度分が必要です。
- ④ 国民年金・農業者年金の控除証明書
- ⑤ 介護保険の保険料証明書
- ⑥ 小規模企業共済の領収書
- ⑦ 年金・生命共済（保険）料・建物共済（保険）料の払込証明書（郵送されています）
- ⑧ 医療費の領収書（生計を一にする家族全員分が対象）
※共済（保険）や高額医療費補助で補てんされる場合は、その金額を調べておく。
※個人ごと、病院ごとで集計してください。
- ⑨ 譲渡所得のある方はその関係書類（売買契約書・費用の領収書 等）



JA静岡市
生活事業

大感謝祭

日時：平成29年1月27日(金) 13:00～19:00
1月28日(土) 10:00～17:00
1月29日(日) 10:00～16:00

会場：JA静岡市本店特設会場(曲金5-4-70)

衣料・宝飾品、メガネ、寝具、家電、太陽光発電 自動車、農業用品など多数！

節分祭豆まき
27日(金) 13:00～



3日間開催！
お楽しみ抽選会

