

南の風だより 5月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

センター長	湯本	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	後藤・池田亜沙美	水稲・野菜・莓	古井・海野・池田里奈	配送員	立花・松風・正込

水稲

1. 元肥の施用 (10aあたり)

コース	ひとめぼれ	キヌヒカリ	コシヒカリ	あいちのかおり	その他品種
省力	ユ-コート666 2.5袋	ナイスアップシカ799 3袋	エココシ18号 2袋	エムコート045 2袋	ナイスワンパワー 2.5袋
化成	元肥エース 1.5袋	元肥エース 2袋	元肥エース 1袋	元肥エース 2袋	元肥エース 2袋
配合	-	-	-	-	もとごえペレット 3袋

※ 化成肥料は、田植前1週間以内の施用とする。(特に、省力コースでは注意する)
また、元肥一発タイプの肥料はよく混ぜ込んで施用するようにしてください

2. 田植期の防除

♪ 簡単で効果抜群 ♪ 箱粒剤の施用で7月いっぱい防除の必要なし!

いもち病 重点	Dr.オリゼプリンス粒剤 10	50g/箱	緑化期～田植当日
紋枯病 重点	フルターボ箱粒剤		田植3日前～当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤08		播種時～当日

※ 効果低減を防ぐため、散布ムラにならないように注意する。

3. 田植機の調整

- 植付株数：70株/坪 にこまる：60株/坪
(高温障害の回避、分けつのとれない場合は80株/坪)
- 植付本数：3～4本/株 (早く分けつし、太い茎をつくる)
- 植付深さ：2～3cm (浅植えにし、早期の活着や茎数の確保を促す)

4. 水の管理

- 田植後～活着：水深4～6cm程度の深水とし、活着を促す。
※ 注意：ジャンボタニシの食害が危惧される場合は浅水管理とする。
- 活着後：水深2～4cm程度の浅水とする
- 田植2～3週間後にガス抜きをする場合は、1～2日間落水する。

5. スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ)

本田や水路で越冬した貝が、5月下旬から活動を開始して田植後の稚苗を食害します。

- 水路の貝が取水口から侵入するので、取水口に網を張る。
- 水深1cm以下では、ほとんどの貝は稲を食害できないので、田植後2～3週間は水深4cm以下の浅水管理とする。
- 例年発生が多い水田は次の薬剤を発生初期に施用する。

スクミリンゴガイ	スクミノン	4kg/10a	収穫60日前-2回
----------	-------	---------	-----------

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

6. 除草剤

★ 除草剤を上手に効かせるために ★

- ① 代かきはていねいに行い、田面を均平にする。
- ② 薬剤の処理時から7日間は水尻を閉じ、かけ流しにしない。
- ③ 処理後、田面が露出しないように水管理をする。(例外：ガス抜き)
- ④ 雑草の多い水田や、水もちの悪い水田では、体系処理で除草を行なう。
- ⑤ 処理後は田に入らない。(足跡に雑草が発生する)

一発処理の場合 (10aあたり)

田植後	薬剤名	量	効果
田植後	フォーマット1キロ粒剤51	1kg	移植後30日まで ノビエ3葉まで
	ウィナー1キロ粒剤51	1kg	移植後30日まで ノビエ2.5葉まで
	キマリテ1キロ粒剤	1kg	移植後30日まで ノビエ3葉まで
	キクトモ1キロ粒剤	1kg	田植後～12日頃 ノビエ2.5葉まで
	ガンガン豆つぶ	250g	田植後3日～30日 ノビエ2.5葉まで
	ミスターホームランLジャンボ	500g	田植後3～10日 ノビエ2葉まで

体系処理の場合 (10aあたり)

田植前	薬剤名	量	効果
田植前	サキドリEW	500ml	代掻き時は田植えまで7日間あける。田植後は田植直後に使用する。(どちらか1回)
田植後	一発処理体系中の1キロ粒剤を使用する	1kg	田植後15～20日頃

☆ 中干頃にも除草剤を散布する。(次号で詳細を掲載します)

その他

アオミドロ 浮き草	モゲトン粒剤	3kg/10a	部分施用も可
--------------	--------	---------	--------



農薬散布後の止水期間は7日間!!

水田除草剤や本田粒剤の散布後7日間は落水やかけ流しをしないよう注意しましょう!

平成29年産米、出荷申込受付中!!

新規に出荷希望の方は営農経済センターまでお問い合わせください

平成29年度 狩猟免許試験について

- ・日 時…平成29年8月27日(日) 午前9時～
- ・会 場…静岡総合庁舎(静岡市駿河区有明町2-20)
- ・申 込…平成29年6月26日(月)～平成29年7月28日(金)まで

☆事前講習会☆

- ・日 時…平成29年7月22日(土) 午前9時50分～午後4時
- ・会 場…静岡労政会館(静岡市葵区黒金町5-1)
- ・申 込…平成29年6月1日(木)～平成29年6月30日(金)まで

※ 申込、問い合わせ等につきましては、南部営農経済センター 小澤まで(237-5580)



かんきつ（病害虫防除）

☆青島温州

6月中旬	ミカンハダニ	マシン油（97%）	150倍	3回	混用可
	かがらみシ類 チャバドザミシ	スプラサイド乳剤 [㊟]	1,500倍	14日-2回	
	黒点病	エムダイファー（水）	600倍	60日-2回	

※施肥：夏肥は満開から6月20日までに、
（青島）みかん50ペレット8袋/10a又はみかん化成1号5袋/10a
（早生）みかん化成1号 4袋/10a

☆スルガエレガント・中晩柑

6月上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	—
------	-------	-----------	-----	---

※ ICボルドー412 に関してはお取り寄せになりますのでご了承ください。

6月中旬	ミカンハダニ	マシン油（97%）	150倍	3回	混用可
	チャバドザミシ かがらみシ類	スプラサイド乳剤 [㊟]	1,500倍	90日-4回	
	黒点病	エムダイファー（水）	600倍	90日-2回	

※施肥：夏肥は6月上旬に、（スルガ）スルガペレット8袋/10a
（ポンカン）みかん50ペレット6袋/10a

茶（病害虫防除）

二茶萌芽期	炭そ病 もち病	オンリーワン（フ）	2,000倍	混用 7日
	ウンカ スリップス	ウララDF	1,500倍	
二茶整枝後	ハマキムシ類	サムコル（フ）	2,000倍	単用 3日
	輪斑病	アミスター20（フ）	2,000倍	単用14日

・「チャトゲコナジラミ」又は「サビダニ」の発生が見られる茶園ではウララDFの代わりに

㊟「コテツフロアブル」（2,000倍・7日）を散布してください。

・アミスター20（フ）の散布は整枝後、速やかに散布

「クワシロカイガラムシ」（防除時期・5月中下旬頃）※地区によって適期が異なります
⇒カイガラムシがいる枝を南部営農経済センター又は最寄りの支店へ持ってきていただければ適期を調べます。

・コルト顆粒水和剤（2,000倍・7日）・㊟スプラサイド乳剤（1,500倍・14日）

・アプロードエースフロアブル（1,000倍・14日）

土の健康診断

土壤分析実施のお知らせ（野菜・莓・花卉）

分析希望の方は、風乾しふるいがけした土200gを、『氏名・電話番号・作物名・施設/露地』を明記の上、最寄りの各支店購買窓口または南部営農経済センターまで提出して下さい。

締切り：平成29年6月15日（木）



※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に㊟や㊟で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。（普通物は、特に表記してありません。）

野菜

トマト・ミニトマト

葉かび病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒（水）	2,000~3,000倍	前日-3回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナSC	2,500倍	前日-2回

☆尻腐れ予防…カルクロン 200倍 各花房の第1花が開花したときに散布

☆着果促進 …トマトトーン 100倍 花房の3~5花が開花した時。1花房に1回散布。
芽や幼葉にかかると葉が萎縮するので、花・花房のみにかかるよう噴霧する。

きゅうり

べと病・褐斑病（予防）	ジマンダイセン水和剤	600倍	前日-3回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナSC	2,500倍	前日-2回
	モベントフロアブル	2,000倍	前日-3回

未成熟とうもろこし

アワノメイガ	プレバソフロアブル	2,000倍	前日-3回
雄花抽出時~	デナボン粒剤5	4~6kg/10a	21日-2回
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回

いちご

1. 親株の管理

- ① 弱いランナーは早期に除去し充実した太いランナーを誘引する。
- ② ランナーは密植とならないよう誘引する。
※親株の古葉やわき芽の整理をし、風通しを良くする。ランナーの側枝は除去する。
- ③ 肥切れしないよう適時追肥をする。（1B化成 6粒/株を2週間間隔）



2. 病害虫防除 育苗炭そ病防除ローテーション（例）

	薬剤名	倍率	回数	混用薬剤 例
5月5週目	ベルコート（水）	1,000倍	5	㊟ピラニカ（EW）
6月1週目	ファンタジスタ（顆水）	2,000倍	3	㊟モスピラン（水）
6月2週目	ジーファイン（水）	1,000倍	-	エコピタ（液）
6月3週目	ゲッター（水）	1,000倍	3	モベント（フ）
6月4週目	オーソサイド（水）	800倍	3	プレバソン（フ）

※発生病害虫を観察し、必要に応じ農薬を選択してください。

極早生たまねぎ講習会を開催します！

開催日時：平成29年6月26日（月） 13:30~ 高松支店

じまん市に出荷できる方・日照時間を確保できる畑をお持ちの方、ぜひご参加ください！
参加を希望される方は、南部営農経済センター池田までご連絡ください。

熱中症にご注意ください！

暑い中の作業、お疲れ様です。『よし、あともう少し！』と頑張っていたく前に、こまめに水分補給をしてください。JAの飲料もご利用くださいm(_)_m

★オススメは静岡の温州ミカンで作られたおいしいみかんジュース★

「みかん日和」果汁70%（みかん3個分） 190g×30缶 1,987円（税込）