

# 南の風だより 10月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3  
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

センター長	湯本	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	後藤・池田亜沙美	水稻・野菜・苺	海野・池田里奈・古井	配送員	立花・松風・正込

## ★土壌処理殺菌剤『ユニフォーム粒剤』紹介★

リドミル粒剤2の生産中止に伴い発売された土壌処理殺菌剤です。リドミルの成分とアミスターの成分の混合剤のため、べと病・疫病・さび病・根茎腐敗病などの重要土壌病害の防除に効果的です。

対象作物 (主要作物のみ抜粋)・・・使用方法はラベルをご確認ください

しょうが・葉しょうが・ピーマン・とうがらし類・ししとう・みずな・こまつな・かぶ・チンゲンサイ・だいこん・ほうれんそう 等

### 秋冬あぶらな科野菜

病害虫	薬剤名	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー
ヨトウムシ コナガ	マッチ(乳)	3,000倍 7日3回	3,000倍 7日3回	3,000倍 14日3回	3,000倍 7日3回
黒腐病 軟腐病	カスミンボルドー	1,000倍 7日4回		1,000倍 14日3回	1,000倍 21日4回

### ほうれんそう

ミナミキイロアザミウマ	パダンSG水溶剤(劇)	1,500倍	7日-2回
ハスモンヨトウ	プレバソフフロアブル	2,000倍	前日-3回

### 実エンドウ(うすいえんどう・グリーンピース)

### さやえんどう(きぬさやえんどう・スナックえんどう)

アブラムシ	アドマイヤー1粒剤	2g/植穴	定植時
ナモグリバエ	パダンSG水溶剤(劇)	1,500倍	前日-3回

### ネギ

アザミヤ類・ヨイシヨトウ	ディアナSC	2,500倍	前日-2回
さび病	ラリー水和剤	2,000倍	7日-3回

## ★ダイコンの抜き菜の注意事項★

- ① 抜き菜に農薬を使用する場合には、抜き菜をする時点を収穫時とみなし、各薬剤に定められた収穫前日数を守るようにしてください。
- ② 播種時に粒剤を施用した場合
  - ・ダイアジノン粒剤5のみ食用にできます。ただし収穫21日前まで(出荷も可)
  - ・一般的に粒剤は収穫前日数が設定されていないので食用・出荷はできません。

## 水稻

### 1. 貯蔵

(1) 収穫調整後の害虫対策は、下記の資材を使用する。

ネルパック*	ネルパック(真空貯蔵袋)にエージレス(脱酸素剤)を1つ入れる。
--------	---------------------------------

\* お米は必ず含水率15.5%以下にしてください。

\* コクゾールは、なくなりました。

(2) 貯蔵時には十分乾燥させ、なるべく低温にする(玄米水分15%以下、温度15℃以下)。

### 2. ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)対策

ジャンボタニシは寒さに弱いので、冬起しをする。貝を地表に出して、寒さにさらす。その後、できるだけ細かく耕うんして、貝を粉砕する。


## お知らせ

### ◎ 土壌検定のご案内について

試料：土200g(ふるいにかけて乾燥させたもの)

締切：11月22日(水)までに支店窓口経由でセンターへ提出してください

土壌のとり方



乾燥させた土はビニール袋に入れ、

住所・氏名・作物・圃場覚えを明記して提出してください。



## JA 静岡市玄米品評会の開催について

規格：うるち玄米500g(氏名・連絡先・品種名を明記してください)

出品：11月13日(月)までに支店窓口またはセンターへ提出してください

## 柑橘(青島温州)

### 病害虫防除

11月上旬	ミカガニ	カネマイトフロアブル	1,500倍	7日-1回
11月中下旬	貯蔵病害	ベンレート水和剤	4,000倍	前日-4回
		ベフラン液剤25(劇)	2,000倍	前日-3回

### 施肥

早生温州	… 収穫70%終了時	みかん50ペレット	5袋/10a
青島温州	… 11月上中旬	みかん50ペレット	5袋/10a
スルガエレガント	… 10月下旬	スルガペレット	6袋/10a
ポンカン	… 11月上旬	みかん50ペレット	6袋/10a

## いちご

- ・葉枚数は4～5枚とし、一度に多くの摘葉はしない。きらび香は古葉のみ除去する。
- ・10月下旬頃に、マルチング・ビニール被覆を行なう。
- ・きらび香は夜温が12℃、紅ほっぺ・章姫は10℃を下回るようになったら保温開始する。
- ・保温開始前までにうどんこ病とハダニの防除を徹底して行なう。

### 【ミツバチの注意点】

- ・巣門は太陽に向くように設置する。(南か東向き)、設置後は巣箱をむやみに移動させない。
- ・訪花適温は20℃～25℃。
- ・農薬の散布には十分注意をする

### 【カブリダニ導入の場合のポイント】

- ・ビニール被覆後の10月最下旬から11月上旬に放飼を行なう。
- ・放飼前に、ハダニ、ヨトウ、うどんこ病の防除を行なう。その際天敵への影響日数を考慮する。
- ・12月頃ハダニの発生が見られた場合は、影響の少ない薬剤を発生した場所にスポット的に天敵を放飼する。毎年ハダニが発生しやすい場所には特に注意する。

### ・天敵に影響の大きい薬剤

アーデント・ロディー・ダブルフェース・ダニトロン・モベント・サンマイルト・ピラニカ等は使用しない。
マラソン・コロマイルト・パロック：14日   コテツ・アファーム：7日   ベストガード：5日

## 病害虫防除

### ①殺菌剤

薬剤名	倍率	使用基準	炭疽	うどんこ	灰色かび	ミツバチ
ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	前日－3回	○		○	－
アフェットフロアブル	2,000倍	前日－3回		○	○	1日
イオウフロアブル	2,000倍	――		○		1日
ポリオキシシンAL水溶剤	5,000倍	14日前－3回		○	○	3日

### ②殺虫

例年ハダニの発生が多いので早めの防除を心掛けましょう！

※コロマイルト乳剤は本圃では使用できません。本圃では水和剤を使用してください。

薬剤名	倍率	使用基準	ヨトウ	ハダニ	ミツバチ	カブリダニ
コロマイルト水和剤	2,000倍	前日－2回		○	1日	14日
トルネードエースDF	2,000倍	前日－2回	○		1日	なし
フェニックス顆粒水和剤	2,000倍	前日－2回	○		1日	なし

### ③ローテーションの例 ※倍率・収穫前日数等は農薬ラベルをご確認ください

10月4週目	ジーファイン水和剤	うどんこ	エコピタ液剤	ハダニ・アブラムシ コナジラミ・うどんこ
天敵・ミツバチ放飼・マルチング・ビニール被覆 天敵導入後1週間は農薬散布しない				
11月2週目	プロパティ(フ)	うどんこ	マッチ乳剤	アザミウマ・ヨトウ
11月4週目	カリグリーン	うどんこ	ダニサラバ(フ)	ハダニ

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

## 茶

### 1. 病害虫防除

秋整枝後	カンザワハダニ	オマイルト乳剤	1,500倍	14日-2回
------	---------	---------	--------	--------

※ ハダニは茶株の裾葉で冬を越します。防除する際は噴口の向きを変えるなどして薬剤が裾葉の裏にかかるように散布して下さい。

☆ 輪斑病の発生が予想される園については、秋整枝直後にカスミンボルドー(1,000倍・30日)を散布すると良いです。

### 平成29年度 狩猟免許試験及び予備講習会について

#### 《試験》

日時：平成30年2月18日(日) 午前9時～午後4時

会場：藤枝総合庁舎(藤枝市瀬戸新屋362-1)

申込み：平成29年12月18日(月)～平成30年1月19日(金)まで

#### 《予備講習会》

日時：平成30年1月6日(土) 午前9時50分～午後4時

会場：静岡労政会館(静岡市葵区黒金町5-1)

申込み：平成29年11月1日(水)～平成29年11月30日(木)まで

※予備講習会につきましては、先着順となっています。(先着300名)

※試験、予備講習会につきましては、受講予定の方は南部営農センターまでご連絡下さい。詳細をお伝えします。

### 【有害鳥獣駆除実施中!!】

駆除期間 平成30年3月31日まで

駆除区 久能山・有度山地区

《事故防止のため、以下の点によく注意して下さい》

- ・期間中できるだけ駆除区への入山をお避け下さい
- ・山へ入る場合は、明るめな服装で目立つようにして下さい

ご理解とご協力をお願いします

平成29年  
4月～10月20日  
イノシシ 50頭

## 廃プラ・廃ビニール回収のお知らせ

- ・廃プラ：11月中下旬予定
  - ・廃ビニール：12月上旬予定
- 委任状を提出された方には後日日程のご連絡を送ります。

肥料年特注文受付中! た〜さんのご予約  
お待ちしております★

肥料・堆肥・培土等多数取り揃えています!  
コスト削減のため、1袋でも多くの予約をお願い致します。  
詳しくは各支店購買・南部営農経済センター窓口へお問い合わせください。

