

長田営農経済センターだより



発行：平成29年1月17日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.246

センター長	茶・有害鳥獣・青壮年部	苺・水稲・蔬菜	果樹	女性部
高橋	海野	堀川・杉山	鈴木	小林
丸子支店購買	購買			
鷺巣	畑沢・糟屋・保崎・岡部・山田			

いちご〔担当：堀川・杉山〕

- [温度管理] 日照時間が少しずつ延びてくるが、低温が続くので、ハウス内の保温に努める
 [灌水管理] 気温が上昇すると蒸散作用が激しくなり、過乾燥になりやすい為、少量多回数の灌水をする
 [株疲れ対策] ① 株疲れ防止 ⇒ 収穫が終わった果梗枝、脇芽は早く除去する
 ハカマが開いて倒れた葉や病葉等は取り除く
 ② 発根を促すため、こまめな灌水をする
 [病害虫防除] うどんこ病・灰色かび病の被害果を除去してから薬剤防除を行きましょう！

病害虫	薬剤名	倍率	使用基準		蜜蜂	カブリダニ	備考
ハダニ類	ニッソラン水和剤	2000倍	前日	2回	1日	○	卵・幼
	スターマイトフロアブル	2000倍	前日	2回	1日	○	卵・幼・成
	マイトコーネフロアブル	1000倍	前日	2回	1日	○	幼・成
うどんこ病 灰色かび病	ポトキラー水和剤	10g/10a	発病前～ 発病初期	—	1日	○	予防
	アフエットフロアブル	2000倍	前日	3回	1日	—	予防
灰色カビ病	ピクシオDF	2000倍	前日	4回	1日	○	予防
	ロブラールくん煙剤【劇】	100g /300m ³	前日	4回	1日	○	予防・治療

野菜〔担当：堀川・杉山〕 ～ジャガイモ（バレイショ）～



- (1) 土作り：ナス科の連作は避け、植え付け2週間前までに堆肥を施用し、よく耕しておく
 そうか病はアルカリ性土壌で発生しやすくなるため、苦土石灰等の施用は控える

資材	元肥	追肥	備考
みのり堆肥	100kg/1a		
燐加安14号	7kg/1a	3kg/1a	普通栽培：開花直前に追肥 早熟マルチ：全量元肥

- (2) 病害虫防除

病害虫	農薬名	施用量	施用方法
そうか病・粉状そうか病	ネビジン粉剤	30kg/10a	作条土壌混和、1回のみ

- (3) 畝立て：畝幅 60cm 深さ10～15cm 株間25～30cm

<種芋の必要量> 8～9kg/1a

大きい芋は芽を2～3個残すよう縦切りし、1つが40～50g程度になるように切り分ける
 切り口を1時間程日光消毒し、風通しのよい場所で2～3日乾燥させてから切り口を下にして植
 えつける

柑橘〔担当：鈴木〕

- ・はるみ、デコポン、スルガエレガントを収穫していない方は収穫しましょう
 収穫の目安 ⇒ 食味はやや酸っぱいが甘みが強くなり、果皮色もオレンジになった頃
- ・土作り管理 1～2月に土壌改良剤を施用
 苦土セルカ2号 10袋/10a 又は アヅミック30 5袋/10a
 「土壌改良剤は、土壌を弱酸性にし、土の保肥力を高め、新根・細根の発生を促進します」

◎貯蔵みかん・ポンカン品評会が1月17日に開催されました。（敬称略）

《青島》	優等	西川 雅祥	《ポンカン》
1等	太田 泰弘	・ 西川 君江	優等 糟屋 訓敏
2等	糟屋 訓敏	・ 糟屋 宗伸	1等 大塚 哲夫

茶〔担当：海野〕

使用時期	病害虫名	薬剤名	倍率	使用基準
1月～2月	チャトゲコナジラミ	トモノールS	100倍	—

※チャトゲコナジラミが発生した園のみ防除してください。葉の裏側に掛かるように散布してください。
 マシン油は、赤焼病の助長する可能性がありますので、ご注意下さい


長田有害対策協議会 伝言板

〔有害鳥獣対策の講習会開催〕

日 時 平成29年2月5日(日)14:00～
 場 所 長田支店2階
 講 師 静岡市役所中山間地振興課 竹内啓之 氏
 内 容 ～野生鳥獣から町と畑を守るために～

- ・ 野生動物の特性について
- ・ 野生動物から農地と市街を守るため
- ・ ハクビシンの屋根裏対策について

※座席等の関係上出席希望の方は2月3日に長田営農経済センターまで連絡ください



～購買・販売からのお知らせ～

- 平成28年購買取引明細書一覧表は購買窓口で、販売売上実績表（共販・じまん市）は販売センター（集荷場）で受け取りください
- 農薬購入の際は、印鑑をご持参ください
- JAポイントカードをお持ちの方は、ご持参ください



不要農薬回収日のお知らせ

1. 回収日 平成29年2月7日(火) 8時30分～11時00分
2. 場 所 長田営農経済センター
3. 事前に申込書を提出された方が対象となります

