



長田営農経済センターだより



発行:平成29年9月20日 電話:259-3233 Fax:259-3164 No.231

センター長	茶・有害鳥獣・青年部	苺・水稻・蔬菜	果 樹	女 性 部
高橋	海野	山森・杉山	鈴木	小林
丸子支店購買	購 買			
内野	畑沢・山本・糟屋・岡部・山田			

JA静岡市ふれあい座談会 日程

10月	曜日	長田管内部農会(地区)	会場	時間
2日	(月)	青木・寺田・鎌田・井尻・佐渡・手越 手越原・丸子新田・東新田・上川原 向敷地上	長田支店	13:30
3日	(火)	石部・用宗	用宗公民館	13:30
		小坂・大和田	元小坂支店	19:00
4日	(水)	広野	広野公民館	13:30
5日	(木)	向敷地	向敷地公民館	19:00
10日	(火)	下川原	下川原支店	18:30

水 稻 [担当:山森・杉山]

- [水 管 理] 出穂後30日間は間断灌水を行い、穂を充実させる
収穫時に人や機械が入り易い様に水管理をする(乾きすぎに注意する)
- [落水適期] 出穂30日後 平年の目安(6/1日田植えの場合)

品 種	落 水 期	収 穫 期
ヒノヒカリ	9/24	10/1
あいちのかおり	9/29	10/4
するがもち	9/24	9/30

8月の平均最高気温が高く、生育が早くなっていることがあるので、生育に合わせて作業をする

- [収 穫] 適期刈り取りの目安 籾が90%黄化した時期
出穂後の日数 早生種(35~40日)、中生種(40~45日)、晩生(45~50日)
- [乾 燥] 7日程度天日干しを行い、玄米水分を15%に調整する(営農センターで測定できます)
乾燥機を使用する場合は、急激な乾燥を避ける
- [ウ ン カ] 台風などによりウンカが発生した場合、スタークル顆粒水溶剤(3000倍、7日前-3回)を散布する

落葉果樹 [担当:鈴木]

防 除

作 物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
桃	10月上中旬	せん孔細菌病	ICボルドー 412	30倍	
			ムッシュボルドー バイカルティ	500倍 500倍	
梨	10月上旬	黒星病・黒斑病	キノドーフロアブル	1000倍	3日前-9回
梅	10月~発芽前	かいよう病	ICボルドー 66D	50倍	

施 肥

作 物	使用時期	肥 料	10a 当たりの施肥量
桃	10月上旬	砂質土壌	6 袋
		粘質土壌	3 袋
いちじく	10月中旬	静岡フルーツペレット	4 袋
梨			6 袋
柿・梅			5 袋
キウイ	10月中旬	ハイワード	5 袋
		レインボーレッド	7 袋
土壌改良材	10月中旬	苦土セルカ2号 (配合肥料と同時施用できます)	10袋

柑 橘 [担当:鈴木]

- ☆ 青島温州の摘果作業(9月中旬~採取まで)
- ・ 10月上旬 までの摘果は糖度を上げる効果があります!
 - ・ 粗皮果、大玉果、すそ枝・内なりの小玉果、天成り果(日焼果)、軸太果などの外観不良果の除去
- ☆ 夏秋梢及びエカキムシ被害枝の切除作業について
夏秋梢は9月中に切除すると発芽してしまうので、10月中旬に切除をしてください

防 除

作 物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
スルガ エレガント	10月中旬	ミドリヒメヨコバイ カメムシ類	テルスター水和剤	2000倍	前日-3回
		黒点病	オキシンドー水和剤 80	1000倍	60日前-3回
早生温州	収穫7~10日 前混用散布	貯蔵病害 (腐敗防止)	ベンレート水和剤 ベフラン液剤 25【印】	4000倍 2000倍	前日-4回 前日-3回

* 台風襲来直前に、かいよう病防除...バイカルティ 1000 倍加用 コサイド 3000 2000 倍散布

施 肥

作 物	使用時期	肥 料	10a 当たりの施肥量
早 生 温 州	10月下旬	みかん50ペレット	5 袋
スルガエレガント	10月下旬	スルガペレット	6 袋

茶 [担当 : 海野]

【防 除】

時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準	使用方法
9月中下旬	クワシロカイガラムシ	コルト顆粒水和剤	2,000	7日-2回	単用
		スプラサイド乳剤【印】	1,500	14日-1回	単用
		アプロードエースフロアブル	1,000	14日-1回	単用

時 期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用 基 準	使用 方 法
秋整枝後	カンザワハダニ	オマイト乳剤	1500倍	14日-2回	単用

輪斑病・赤焼病の発生が予想される園では、秋整枝直後にカスミンボルドー1000倍(30日)で散布してください。

【管 理】

秋整枝について

時 期 : 平均気温が18~19度以下になった頃(再萌芽を防止するため)

整枝程度 : 葉層を8cm以上残すようにする

2番茶摘採面より4~5cm程度(三番茶の葉を2~3枚残す)上で整枝して下さい

いちご [担当 : 山森 ・ 杉山]

定植後の管理

- ・ 定植後一週間は手灌水を実施し、活着を促進させる
- ・ 紅ほっぺの葉かきは、定植2週間後を目安に始める。章姫は随時葉かきをし、病虫害を残さないようにする
- ・ 春先にうどんこ病が発生した苗は、下記の表を参考に薬剤防除を行う
- ・ ビニール被覆は最低夜温が10℃を下回ったら保温を開始する

防 除

病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用 基 準	※ 天 敵	蜜 蜂
灰色かび病・炭そ病	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前-3回	影響なし	3日
うどんこ病・炭そ病	サンリット水和剤	4000倍	前日-3回	影響なし	1日
	アミスター20フロアブル	2000倍	前日-3回	影響なし	1日
うどんこ病	ジーファイン水和剤	1000倍	前日-なし	影響なし	1日
ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	前日-2回	14日	1日
	パロックフロアブル	2000倍	前日-1回	14日	1日
ハスモンヨトウ	トルネードエース DF	2000倍	前日-2回	影響なし	1日
アザミウマ	マッチ乳剤	1000倍	前日-4回	影響なし	1日
アブラムシ類	ベストガード粒剤	1g/株	定植時-1回	影響なし	14日
コナジラミ	コルト顆粒水和剤	3000倍	前日-3回	不明	7日以上

※天敵(カブリダニ)に影響を与える日数 ⇒ 例)コロマイト水和剤を散布したら、14日間は導入しない

里芋(唐芋) [担当 : 山森 ・ 杉山]

遅い追肥は芋の品質に悪影響が出るので、配合肥料等の施用は控える

病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用 基 準
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	前日-2回
ハダニ	コテツフロアブル【印】	2000倍	7日-2回

～ お知らせ ～
長田農業祭について



日 時 : 11月3日(金) 9:00 ~ 12:30 場 所 : 長田支店

女性部バザー ・ 青空市 ・ 農作物販売 ・ 焼きそば等の模擬店 等

・青空市出展者を募集します! 申し込みは最寄の支店へ

有害鳥獣駆除実施について



駆除期間 平成29年9月1日~10月31日まで

駆除範囲 長田・丸子一円

駆除対象 イノシシ・サル・ハクビシン・タヌキ・アナグマ

イノシシの被害が増えてきていますので、防護柵や電気柵などで対策してください。

日本農業新聞・家の光購読推進!

申込・お問合せ先

長田営農経済センターまで(054-259-3233)

各種苗木及び図書注文取りまとめ受け付中!

「平成30年春出し柑橘類苗木 注文」 …平成30年春配布予定

「平成30年春植え用香花他苗木 注文」 …平成30年3月配布予定

「平成30年春植え用茶苗木 注文」 …平成30年3月配布予定

「営農図書申込み」 …10月下旬~配布

ご注文先は、部農会の

回覧注文書

又は長田営農経済センター・丸子支店へ申し込み下さい。

注文・申込締め切り日: 10月20日(金)

購買店営業日時変更について

購買営業時間は、上期決算の為に下記の様に変更となります。

9月29日(金) 8:30~12:00

9月30日(土) 休業

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。