

長田営農経済センターだより




発行：平成28年3月17日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.237

センター長 高橋	茶・有害鳥獣・青壮年部 海野	苺・水稻・蔬菜 堀川・池田	果樹 鈴木	女性部 小林
購 買				
望月・鷺巣・糟屋・岡部・荻葉				

いちご (担当：堀川 池田)

[今後の管理]

- (1) 今年もアザミウマ、ハダニが多発！早期発見をし、防除に努める
- (2) 根の更新、病害虫防除のため下葉を除去する
- (3) 灰色カビ病の対策として換気を適宜おこない、雨の続いた日は灌水を控える



[親株管理]

- (1) 充実したランナーを発生させるため、3月下旬～4月上旬に親株を定植する
- (2) 育苗資材はイチバン（500～1000倍）で消毒してから使用する
- (3) 肥切れを防ぐため、施肥管理に気をつける
 (元肥タイプ) 新エコロング413 (140日) 10g/株
 (追肥タイプ) IB化成 4～6粒/株 (2週間間隔)

病 害 虫	薬 剤 名	倍 数	使用基準	蜜 蜂	天 敵	備 考
ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	前日-2回	1日	×	卵・幼・成
	ダニサラバフロアブル	1000倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
アザミウマ	マッチ乳剤	1000～2000倍	前日-4回	1日	○	遅効性
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	前日-2回	3日	△	
うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤(EBI)	2000倍	前日-2回	1日	-	予防・治療
	アフエットフロアブル	2000倍	前日-3回	1日	○	予防
灰色カビ病	スミレックスくん煙粒剤	50g/500㎡	前日-3回	1日	○	

※ 天敵 ○：影響(小) △：導入直後は使用しない(導入1ヶ月が目安) ×：影響(大)

平成27年度 苺果実抜き取り品評会

平成28年3月16日実施 入賞おめでとうございます!



<きらび香> 優等 杉山 勝栄 様 (広野)

<紅ほっぺ> 優等3席 和田 佳子 様 (大和田)

1等 河口 稔 様 (みずほ)

1等 池ヶ谷 すず江 様 (東新田)

1等 梅木 憲昭 様 (広野)

3等 鷺尾 一 様 (手越)

落葉果樹 (担当：鈴木)

作物	使用時期	病害虫	薬 剤 名	倍 数	使用基準
桃	4月中下旬	モモハモグリガとシンクイムシの防除に交信攪乱剤を設置しましょう コンフューザーMM ⇒10aあたり100～120本			
	4月中旬 混用可	タンソ病・灰星病 アブラムシ類	フリントフロアブル25 【EP】モスピラン顆粒水溶剤	2000倍 2000倍	前日-3回 前日-3回
	4月下旬 混用可	黒星病 シンクイムシ	サルファーソル スタークル顆粒水溶剤	500倍 2000倍	— 前日-3回
梨	4月上旬 混用可	黒星病/赤星病 アブラムシ類 シンクイムシ	ベルコート水和剤 【EP】モスピラン顆粒水溶剤 又は、スタークル顆粒水溶剤	1500倍 2000倍 2000倍	14日-5回 前日-3回 前日-3回
	4月中旬	黒星病	スコア顆粒水和剤	4000倍	14日-3回
	4月下旬 (落弁期)	黒星病・赤星病 アブラムシ類	オーシャイン水和剤 【EP】オリオン水和剤40	4000倍 1000倍	前日-5回 3日-2回
ハイウード	開花前まで 混用	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ	2000倍 1000倍	— —
	4月下旬	花腐細菌病	主幹部に環状剥皮処理(幅0.5～1cm)		
レインボー	開花前まで 混用	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ	2000倍 1000倍	— —
	4月下旬	灰色カビ病 果実軟腐病	ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回
イチジク	4月中旬	アブラムシ	アディオン乳剤	2000倍	前日-2回
		ネコブセンチュウ	ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	60日-1回
*4月下旬頃から芽かきを行いましょう。直上芽や下向き芽を欠き、横芽を残します。残す枝の間隔は50cm程度(結果枝が多過ぎると着色不良になります)					
梅	4月上旬	黒星病 カイヨウ病	ベルコート水和剤 マイコシールド	2000倍 1500倍	30日-3回 21日-4回
	4月下旬	黒星病 カイヨウ病	オーシャイン水和剤 スターナ水和剤	3000倍 1000倍	前日-3回 7日-3回

柑橘 (担当：鈴木)

品種	時期	病 害 虫 名	薬 剤 名	倍 数	使用基準
中晩生柑橘 不知火・はるみ ・スルガ	4月上中旬	ミカンハダニ ホコリダニ	マシン油乳剤(97%)	100倍	—
		マシン油とICボルドー66Dの近接散布は2週間以上あける			
温州みかん	4月上中旬 混用可	ミカンハダニ ホコリダニ	マシン油乳剤(97%)	100倍	—
		そうか病(多発園)	マネーシDF	4000倍	30日-3回
共 通	4月中旬	葉面散布の混用	リンクエース	1000倍	花芽充実

《JA 静岡市中晩柑品評会》

*入賞おめでとうございます！

スルガエレガント	1 等	中西 長一郎
	3 等	成澤 四郎
不知火	優 等	糟屋 訓敏

水稻 (担当: 堀川・池田)

～水稻種子の芽出しについて～

近年、猛暑の影響で休眠が深くなっている種子があるので、確実に芽出しをする

- ① 種子消毒を確実にを行う
- ② 浸種時の水温は10℃以上を確保する
- ③ 浸種積算温度の日安100℃が目安
- ④ 種子の発芽を確認し、確実に発芽させる

水稻の準備は計画的に！

- ① 苗箱などの資材はイチバン（1000倍）に浸清し、消毒しておく
- ② 田植えに向けて荒起こしをし、田植えの準備を進める
- ③ 土壌改良資材を投与し、土作りをする

オススメ資材：珪力燐 6～8袋/10a または とれ太郎 3袋/10a



茶 (担当: 海野)

施肥	1 茶芽出し肥①	3月下旬	化成肥料	3袋/10a
	1 茶芽出し肥②	摘採14日前	化成肥料	3袋/10a



茶生産者の方々へ

茶製造前の工場内掃除は丁寧に行ってください。特に下記の部分は念入りに行ってください

- ・粗揉機や揉捻機の中
- ・火炉の部分
- ・棚の乾燥機の中 等

防除時期	対象病害虫	使用薬剤名	散布濃度	使用方法	摘採前日数
3月中・下旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2000倍	単用	14日

効果⇒殺卵・殺幼虫が主（散布により成虫には効果は低いが、成虫が卵を産んでもふ化を抑制）

※その他

チャトゲコナジラミとカンザワハダニの同時防除にはダニゲッターフロアブル【2000倍】（7日）

JA静岡市グリーンティフォーラム2016開催

受付日時 平成28年3月28日（月） 13:30 ～ 16:30

会場 グランシップ 11階 会議ホール「風」

内容 功労者・各審査会優秀者表彰、基調講演、情勢報告、福引き他

◎盛りだくさんな内容となっております！茶生産者の皆様、ぜひ会場へ足をお運びください。

野菜 (担当: 堀川 池田)

対象作物	病害虫名	薬剤名	倍数	使用方法	使用時期	使用基準
トマト ピーマン ナス	アブラムシ類	アドマイヤー1 粒剤	1～2g /株	植穴又は 株元土壌混和	定植時	1回

※「オルトラン粒剤」「オルトラン水和剤」は平成26年11月17日に登録内容の変更がされました。使用する場合は、新しい登録内容を確認してから使用してください。

サトイモ (担当: 堀川 池田)



① 種の準備

- ・種芋を6kg/1aを準備する
- ・芽出しをする場合、日当たりの良い畑に苗床（催芽床）を作り、トンネル被覆する
又は3、5号ポットへ土を詰め種芋が少し見える程度に埋めて上にわらとビニールを掛ける

② 畑作り・元肥施用

- ・植付け2週間前…みのり堆肥 100kg、苦土セルカ2号 10kgを施用する（1a当たり）
- ・植付け1週間前…菜種粕 8kg、有機化成10号 4kgを施用する（1a当たり）

購買事業からのお知らせ

- ・長田、丸子の購買店舗の営業時間

決算棚卸のため **3月31日（木）は12時からお休みとなります。**

・購買商品紹介コーナー **べにふうき**

☆花粉シーズンのおすすめ商品☆

『べにふうき』ペットボトル 350ml×24本 2,470円

オススメポイント：静岡産100% アレルギー抑制に効果が期待されるメチル化カテキンが豊富！

花粉の飛散も本格的に始まりました！ムズムズやかゆみなど辛い季節です…

花粉症対策や毎日の健康生活サポートのために「べにふうき」をどうぞご利用下さい！



有害鳥獣駆除実施について

駆除期間：平成28年3月1日～5月31日

駆除範囲：長田・丸子 一円

対象鳥獣：イノシシ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ・ニホンジカ・サル・カラス・ヒヨドリ・ドバト

実施期間中の事故がないよう皆様の協力をよろしくお願いします