

くじらがいいけ 3月号

しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

センター長	茶	茶・有害鳥獣	野菜・水稲・苺	果樹	女性部	購買
伊藤	佐藤	野崎	松尾	榮	平野	市川・山本
配送	寺田・加藤	大河内地区担当	秋山	梅ヶ島地区担当	望月	

《茶》1番茶摘採に向けて重要な管理の時期です。

今年の1番茶は昨年と同様に茶商の選別買いが激しいと予測され、ミル芽で良質な荒茶の順に取引が成立します。ですので、自園・共同問わず、しっかりとした生葉生産と適期摘採に努めて下さい。

- 古葉や木茎が混入しないように、摘採面のチェック！！
- ミル芽摘採の奨励・適期摘採に心がけ、刈遅れが無いように摘採計画を検討する。
- 自園・共同工場の製茶機械においても掃除の徹底！！
- 通常の摘採よりも少し早く始めた方がスムーズかつ良質な茶ができます。
- 防霜棚・防霜ファンなどを使用し、防霜対策の徹底に努める



〔施肥〕1番茶の生育・品質・収量に関わる大切な肥培管理です。

芽出肥 1回目 3月下旬（山間地 4月上旬） 化成 3～4袋/10a
 ※みのり1番 萌芽期（摘採35日前）やや早めがオススメ 6袋/10a
施肥後は根を傷めない程度に、土と軽く混和してください。
 芽出し肥 2回目 摘採20日前（硫安など速効性化成） 3～4袋/10a

〔病害虫防除〕

暖冬の影響からカンザワハダニの発生が早く、密度が多くなる傾向です。高品質な1番茶の生葉を摘採するためにしっかりと防除を行いましょ！

☆カンザワハダニ 3月中下旬 バロックフロアブル 2000倍 14日 単用
 （※注意 バロックは、サビダニには効果がありません。）

※ バロックフロアブルは殺卵・殺幼虫効果主体であり、成虫には効果がないがその成虫が産んだ卵はふ化しない。

☆POINTその他ダニ防除について☆

- ※ 摘採前にダニが発生した時 劇コテツフロアブル 2000倍 7日 を単用散布する。
- ※ ダニ類の多発した時 ミルベノック乳剤 1000倍 7日 を単用散布する。

☆チャトゲコナジラミ

チャトゲコナジラミ ダニゲッターフロアブル 2000倍 7日 単用

多発生・増殖を防ぐ為にも地域単位での徹底防除を心掛けて下さい。

スソ以外にも茶樹冠部まで『すす病』が発生している茶園が目立ちます。樹冠部まで『すす病』が発生すると収量・品質に悪影響を及ぼします。

※注意！！ 劇マークの農薬を購入する際には印鑑が必要となり、印鑑がない場合は販売できません。

必ず1年に1回以上点検を行いましょ！！

〔凍霜害対策〕

3月中ごろからの「おそ霜予報」に注意して、凍霜害対策をして下さい。

◎降霜が予想される気象条件

※移動性高気圧が日本列島を覆い、夕方の気温が比較的低温、午後6時の湿球温度が6℃以下のとき。

※夜間を通じて、快晴または晴れて上空に雲がなく、風が弱いとき。

〔防霜ファンのセット〕

3月中旬を目安に電源オン（萌芽2週間前）

温度設定の例 3月中～下旬 3℃ / 4月上～中旬 4℃ / 4月中旬～ 5℃

〔製茶機械の掃除・点検〕

茶期も近くなりました。稼働初日からムズに製造ができるように、事前の掃除・点検は念入りに行ってください。

- ◇茶ぼこりの除去（火炉注意）
- ◇重油・ガスの確認
- ◇バネ圧、葉ざらいの間隔、風量の点検
- ◇回転数の確認
- ◇各種バルブのたるみ破損の確認 等

調整が必要な方は、しづはた営農経済センターへご連絡下さい。

茶栽培履歴（防除・施肥作業記録用紙）提出のお願い

茶園管理作業等でお忙しい時期ですが、施肥・防除管理終了後、ただちに作業記録用紙に記帳し、最寄りの農協までご提出をご協力をお願いします。

茶商からの栽培履歴開示請求に迅速に対応し、相互の信頼関係を築いていき、より強固な販売体制を作っていきます。

提出時期 一茶期前の防除管理終了後、ただちに

提出先 しづはた支店・大河内支店・梅ヶ島支店

※ 共同工場は各組織ごとに栽培日誌の取りまとめをお願いします。

※農協共販では荒茶出荷時前までに生産履歴の提出が必要となりますので、必ず提出にご協力下さい。未提出の方については出荷ができません。



春の農作業や1番茶の最中の水分補給に農協飲料を！！

静岡緑茶ボトル缶 400g×24本 2,592円

はちみつレモン 300g×24本 2,203円

静岡みかん めぐみ70 190g×30本 1,901円



お求めは購買へ♪



《水 稲》

土作り資材の施用 珪酸資材の投入

農力アップ 珪力燐	5袋/10a	病害に強くなる 倒伏しにくくなる 食味が向上する
とれ太郎 ←省力型土作り資材 けい酸加里プレミア	3袋/10a	

倒伏防止と食味向上 マリンハート施肥時：珪酸資材は分量に減肥でも可

マリンハート（結成カリマグ）	5袋/10a	倒伏防止、食味向上
----------------	--------	-----------

《玉 葱》

病害虫防除

腐敗病 軟腐病	アグリマイシン 100	1,000 倍	7日-5回以内	交互散布
	カスミンボルドー	1,000 倍	14日前-無制限	
白色疫病 べと病	リドミルゴールドMZ	1,000 倍	7日-5回以内	

《ナス・キュウリ・にがうり・トマト・ミニトマト》

病害虫防除

アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ類	アドマイヤー1 粒剤	1~2g/株	定植時
--------------------	------------	--------	-----



《ほうれん草》

病害虫防除

タネバエ	ダイアジノン5粒剤	6kg/10a	播種時
コナダニ類	劇コテツフロアブル	30kg/10a	は種前まで

《枝 豆》

病害虫防除

タネバエ	ダイアジノン5粒剤	4~6kg/10a	播種前
------	-----------	-----------	-----

《香花、榊、シバ》（茶園隣接圃場では農薬散布ドリフト注意!!!）

病害虫防除

グンバイムシ類	スミチオン乳剤	1,000倍	
サビダニ	劇コテツフロアブル	2,000倍	刈アザミウマ可

《アスパラガス》

ハウスでは本格的に収穫が始まったところもあります。

春芽が出てきたら十分灌水し、ハウスやトンネルを閉め切り、『蒸しこみ』をしましょう。

25℃を目安にトンネルやハウスの開閉を行い、温度管理してください。

収穫し始めてから、1ヶ月半~2ヶ月経ったら立茎させます。それまではどんどん収穫していきましょう。しかし、途中で曲がり芽や細い芽が出てきたら、立茎させたほうが良いです。

アスパラガス栽培してみませんか？

JA静岡市で推進している作物の中の1つです！

ハウス(雨よけ)必須、灌水設備、排水性、保水性の良い土壌で栽培しやすいです。

一度植えたら10年近く植えたままなので、苗づくり、定植の手間がなく、省力的！

2年目以降は3月~10月まで、毎日収穫できます。

資料等もありますので、気になる方は是非、営農センター 松尾 まで連絡ください！

《いちご》

☆ 近況 ☆

天気の悪い日が続くと、灰カビが発生しやすい環境になります。症状が出ている箇所はすぐに除去し、ハウスの外に出してからロプラールやスミレックスくん煙でハウスごと消毒をしてください！

また、ダニが消えていない圃場についても徹底防除おねがいします。

○今後の管理

- (1) 本圃の管理：下葉・果房の除去や芽の整理を行う。
- (2) 特にスリップス、ダニなどの病害虫防除に努める。
サイドの換気と伴に害虫が飛び込みますので注意して観察してください。
- (3) 気温が少しずつ上がってきました。温度管理、灌水量に注意してください。高設の方は排液量のチェックをしてください。
- (4) 次年度用の親株は雨除け下で管理し、採苗床の準備をする。資材はイチバンで消毒を！
（紅ほっぺは早出しを狙う為、遅くとも3月中もしくは、4月最上旬に定植してください。）

★★★炭疽病対策：プランター等へ親株定植後培土量の10%程度の「いちごいちえ」を覆土

「いちごいちえ」：炭疽病発病を軽減する為の資材です。＜薬剤散布も併用＞

親株を雨除け下へ置くことでかなり保菌率を下げる事が出来ます。

※「いちごいちえ」が厚すぎると下の根まで水が届かないことがありますので、土が隠れる程度にしてください。

生物薬剤：タフパールは3週間ごとに1度、日没2時間前に散布し散布後8時間は

葉面灌水を避ける。殺菌剤（ボトキラー以外）との混用はできません。

展着剤はクミテンなどを使用し、浸透性の展着剤は使用できません。

病害虫防除 残された使用回数を確認して散布してください。

☆収穫中につき、果実の汚れを考慮した倍率にしてあります☆

炭疽病	(治療)ファンタジスタ顆粒水和剤	1,500倍	灰カビにも効果あり
うどんこ病	(予防)アフェットフロアブル	2,000倍	灰カビにも効果あり
	(予防)パンチョTF	2,000倍	
	(治療)サンクリスタル乳剤	500倍	ジーファイン 1,500倍と混用
灰色かび病	(予防)スミレックスくん煙剤	6g/100m³	うどんこ病にも効果有り
	(予防)カンタスドライF	1,500倍	
灰色かび病 うどんこ病	(予防)フルピカフロアブル	2,000倍	果実の汚れに注意
	(予防)フルピカくん煙剤	50g/500m³	

灰色カビ対策：果房に被さる下葉は除去、感染源は処分しハウス内の喚起を図る。

ハダニ・アブラムシ・ヨトウ・スリップス・コナジラミ 《特に奇形果防止：スリップス要防除》

薬 剤	倍 率	ハダニ	アブラ	ヨトウ	スリップス	コナジラミ	蜂	天敵
コロマイト水和剤	2,000倍	○					1日	14日
ダブルフェースフロアブル	2,000倍	○					1日	14日
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍				◎		3日	1日
ロムダンフロアブル	2,000倍			○			1日	○
アーデント水和剤	1,500倍	○	○		○		3日	×
チェス顆粒水和剤	5,000倍		○			○	1日	○

天敵（チリカブリダニ）に影響の少ないダニ剤

テデオオン水和剤 ニッソラン水和剤 ダニサラバフロアブル スターマイトフロアブル

マイトコーネフロアブル カネマイトフロアブル アカリタッチ乳剤 エコピタ液剤

ダニに有効な展着剤：ブレイクスルー スカッシュ 但しアスター等の殺菌剤等の混用は葉害を生じる恐れあり

※ダニに影響がある展着剤は天敵にも影響があります。

農薬以外の有効資材：トップハーベスト 1,000倍 + 福磨 500~1,000倍

灰カビ、うどんこ、ダニ、アブラムシ、オンシツコナジラミ 等

《柑橘》

3月終盤になり、剪定作業が終盤にさしかかっている頃合いだと思います。4月に入ると、みかんの防除では主にダニ類の防除となります。使用する農薬はマシン油乳剤になりますが、4月の天候は雨が多く農薬散布がしにくい状況となります。防除を行う場合は天候に注意して防除適期を逃さぬように実施してください。

● 防除

作物名	散布時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
温州みかん	4月中・下旬	ハダニ類	マシン油乳剤97%	100倍	3回
		そうか病	マネーシDF	4,000倍	30日—3回
中晩柑	4月上・中旬	ハダニ類	マシン油乳剤97%	100倍	3回

※ 3月にボルドー剤を散布した園地は2週間間隔をあけてマシン油乳剤を散布する。

※ ハダニ類の防除適期は春芽が5mm程度に揃った時期

● 落葉果樹

作物名	散布時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
露地いちじく	4月中旬	アブラムシ類	アーデント水和剤 又はアディオン乳剤	1,000倍 2,000倍	前日—2回
ハウスイちじく	4月上旬	疫病	Zボルドー クレフノン	1,000倍 200倍	—
	4月中旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	前日—1回
	4月下旬	アザミウマ類	劇モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
梅	4月上旬	黒星病	ベルコートフロアブル	2,000倍	30日—3回
	4月中旬	黒星病	トップジンM水和剤	1,000倍	21日—3回
		アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	3,000倍	7日—2回
			又はスタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日—3回
4月下旬	黒星病	スコア顆粒水和剤	3,000倍	前日—3回	

◆購買営業時間変更のお知らせ◆うはた支店・昭府町支店

3月31日(木) 正午まで営業… 棚卸し決算のため



その他の業務は通常通り営業しております。
ご迷惑おかけして申し訳ありませんが、皆様のご理解とご協力をお願い致します。