



美和堂農経済センターだより



JA静岡市

電話：296-2121 ファクシミリ：296-2125
電子メール：miwaeino@shizuoka.ja-shizuoka.or.jp

センター長	森内	お茶	野崎	水稻・苺・野菜	小澤	購買	酒井
女性部	市川	お茶	平野	水稻・苺・野菜	片井	購買	秋山

お知らせ

☆固定資産台帳（減価償却資産）ご利用の皆様へ

農業・不動産収支計算では、減価償却費の算出が必要となります。（不要になる方もいます）
農協では税務申告のお手伝いとして、この減価償却費の計算（登録）を行っています。

☆現在登録済みの方は、12月の訪問日で現在の明細を送付します。

登録内容に追加や削除のある方は記入して提出して頂きますので準備しておいて下さい。

☆新規に登録を希望される方は、農業用の車両・倉庫・農機具等の取得金額や時期をお調べの上、最寄りのJA窓口へ問い合わせ願います。

◎登録数に関係なく年間1,500円利用料が掛かりますのでご了承下さい。（後日引き落とし）

平成28年度分の利用料につきましては、

12月20日(水)に、ご登録の口座より引き落としをさせていただきます。

【購買情報】

平成30年 年特肥料推進運動実施中！

年特で肥料を注文されると、普段購入される価格よりも安くなります。

既に注文書を提出頂いている方で追加注文する場合は、最寄りの支店へ問い合わせください。


尚、注文書に載っていない肥料銘柄は、恐縮ですが空欄部分に銘柄名を記入して注文ください。

☆農協取扱い肥料銘柄一部紹介 ☆※各種資材が揃っています。ぜひ、ご注文をお願い致します。

<農協取扱い銘柄>	N-P-K-Mg	予約価格	説明
・『JA ナイス配合』	9-2-4-2	20kg @1,490	有機率50% JA一押しのお得な配合！
・『JA ほかし妙光配合』	10-2-2-3	20kg @1,990	大豆発酵液入。土作りに適した配合！
・『苦土セルカ2号(粒)』	Ca-40 Mg-7	20kg @1,190	牡蠣殻を主原料とした有機質石灰！

※肥料情勢等により、供給価格が表示価格を超える場合がありますのでご了承下さい。

～毎年恒例！新年を心豊かに迎える～



一押し商品 // お買い得セット 9,200円(大) (通常価格 10,200円)
3,500円(小) ※チラシをご覧ください。

茶【茶栽培日誌の回収について】～記帳確認のため提出願います～

最終防除が終わった方から、適宜、下記のとおり提出願います。

◎対象者：荒茶共販出荷者（関係者には通知します）

◎提出物：茶栽培日誌（緑色のファイルをそのまま）

◎提出先：最寄りの農協支店窓口

◎提出期日：**平成30年 1月12日（金）**

◎返却：記帳状況確認後、平成30年用の新しい用紙をセットして

平成30年 2月の訪問日（2月20日頃）にて返却する予定です。

※返却前に防除・施肥 記帳があれば、別の紙に書いておいて下さい。

【寒害対策】

寒害とは・・・茶樹は、越冬に備えて樹体内の水分含量を減らし、蓄積されたデンプンを糖に変え耐寒性を高めます。この耐寒性を越えた低温や寒風により発生する障害をいいます。

◎寒害受けやすい茶園

- ・秋芽の硬化が遅れた園
- ・冬の寒気が強くあたる園
- ・くぼ地で冷気が溜まりやすい園
- ・樹勢が劣っている園 など

◎対策

☆防風垣の設置 → 茶樹に当たる風を弱め、幼木園の青枯れや落葉を防止

・ネットは網目が2～4mm、通風率が40～60%程度のもの。

・効果は、垣の高さの5～6倍の範囲

☆敷草の施用 → 土壌の乾燥防止や地温の低下を軽減（800～1,000kg/10a）

【防除】

◎灰色カビ病 この時期に気温が高く、降雨が多いと発生が心配されます。

開花盛期または落弁期に ⇒ フロンサイド SC（2,000倍）または ベフドー水和剤（500倍）

◎赤焼病

カスミンボルドー 1,000倍 30日 ・ ドイツボルドーA 500倍 14日

☆感染期の防除として秋に1回目を行い、

越冬病斑が多い園では、春先（2月中旬～3月中旬）の2回防除が効果的です。

※カスミンボルドーの使用回数は1回・摘採前日数30日です。ご注意ください。

※銅剤を1ヶ月以内に連続して散布すると葉害が生じることがあるので注意して下さい。

◎チャトゲコナジラミ（冬季防除について）すす病発生園では防除の徹底を

被害・・・大発生すると、すそ部に「すす病」（古葉が黒くなる）が生じます。

防除・・・1～2月にかけてマシン油乳剤（100倍）を散布して下さい。

※400ℓ/10a 幼虫・卵がいる、すそ部・葉裏を重点に散布

※マシン油を2回散布することにより防除効果が上がります。（1ヶ月以上間隔を空ける）
また、晴天が2～3日続く時に散布して下さい。

※マシン油は、赤焼病を助長する恐れがあります。
心配な場合は、7日前に銅剤を散布ください（混用はしないこと）。


いちご

1. 株管理

- ① 摘葉…基本的には古葉のみ葉かきを行う。(病虫害防除にもつながります。)
- ② 灌水…少量多灌水を行う。
※高設栽培の方は排液量のチェックを！ECメーターを活用してください！
- ③ 芽の仕立て…2芽管理を徹底する。芯止まり株の発生に注意！早めにランナーを回す。
きらび香は芽数が紅ほっぺより少ないので放任とする
- ④ 摘果…頂果房7個～10個まで。(きらび香も同程度)
※1.5番発生株(腋果房が連続して出蓄しているもの)は摘果をきつく行い、調整する。

2. ハウス内温度管理 **暖房機の清掃・点検、ハウスの気密性を高めましょう！**

- ① 夜間最低温度 7～8℃
- ② 4段サーモ活用(早朝加温で、炭酸ガスの施用効果を高める。)



- ③ 日中 25℃～26℃。午前中やや高め、午後なるべく 25℃を保つように温度管理を行う。
※ハウスの隙間を減らし機密性を高めておきましょう。天窓・側窓を早めに閉め夜温確保
※ミツバチの消耗を防ぐため、28℃を超えないよう管理をしましょう。

3. 病虫害防除 ☆薬剤の収穫前日数には十分注意してください。

10月下旬以降、ハダニ・ウドンコ病が目立ってきました。早期の防除を心掛けて下さい。

☆ハダニ

- ※エコピタ、サフオイルなどの気門封鎖剤は物理的に天敵に影響があるので注意する。
- ※天敵を導入後、定着するまで(2週間)は農薬散布を控える。
- ※天敵導入後、ダニの発生が止まらない場合は早期に薬剤防除に切り替える。



薬剤名	倍率	日数	回数	成虫	幼虫	卵	ミツバチ	天敵	備考
ダニサラバ(フ)	1000倍	前日	2回	○	○	○	1日	○	
スターマイト(フ)	2000倍	前日	1回	○	○	○	1日	○	
エコピタ(液)	100倍～	前日	—	○	○		1日	△	薬害
サフオイル	300～500倍	前日	—	○	○	△	1日	△	薬害
カネマイト(フ)	1000～1500倍	前日	1回	○	○	△	1日	○	薬害
ニッソラン(水)	2000～3000倍	前日	2回		○	○	1日	○	殺卵
マイトコーネ(フ)	1000倍	前日	2回	○	○	○	1日	○	

☆うどんこ病・灰色かび病

- ※EBI剤(トリフシ・リ・パソ)TF等は花粉に薬害が出るので花盛りの時期には散布を避ける。
- ※うどんこ病は1回の農薬散布では完治しにくいので、種類を換えて徹底して防除する。
- ※灰色かび病は農薬散布以外に換気と発病果実の圃場外への除去に心掛ける。

薬剤名	倍率	日数	回数	う	灰	備考
シグナムWDG	2000倍	前日	2回	○		加灰+ストピル(アミスター等)系
パンチョTF(顆水)	2000倍	前日	2回	○		EBIの混合剤
プロパティ(フ)	3000～4000倍	前日	3回	○		病斑は残る
アフエット(フ)	2000倍	前日	3回	○	○	よく振ってから希釈
カリグリーン	800～1000倍	前日	—	○	○	高温時薬害注意

4. きらび香の裂皮等対策 果皮が硬い為裂皮しやすい。現在原因として挙げられているものは、

- ① 温度管理…低夜温管理による温度差・成熟日数の長期化が影響 早めに閉める
- ② 気門封鎖剤の影響・エコピタ・アカリタッチ等の連用を控える。
- ③ 農薬の影響…散布した農薬の水分が果実に長時間残ると出やすい 夕方の散布は注意
- ④ ホコリダニの発生・圃場への持ち込みを防ぎ、早期に防除を行う
- ⑤ 硫黄のくん蒸…長時間くん蒸すると出やすい

水稻

土作り資材の投入

収量の安定、品質の向上のためにケイ酸質資材を施用しましょう

珪力燐	6～8袋/10a	石灰、ケイ酸、苦土+リン酸の補給
農カアップ	5袋/10a	ケイ酸質肥料・鉄・マンガン・苦土・リン酸を含む
けい酸加里	2～3袋/10a	ケイ酸32%、カリ20%で品質向上。微量元素も
オイスターミネラル	5袋/10a	牡蠣殻+ケイ酸のw効果。発根促進で増収効果。

施用量が珪力燐の3分の1で省力化おすすめです！

ワラ分解促進剤の投入

ワラを分解するとケイ酸などの栄養も入っており、土壌改良剤としての役目もある

ワラ分解キング	1袋/10a	微生物が添加培養されており、稲藁の分解を促進する資材(年内に稲藁と一緒にすきこむ)
---------	--------	---

野菜

今年はヨトウ類の発生が多く見られます。徹底した防除を！

秋冬あぶらな科野菜

軟腐病は地際の葉がアメ色に溶けて特有の悪臭を放つ。発生した株は抜き取り圃場外に処分してから薬剤散布をすること

病虫害	薬剤	キャベツ	ハクサイ	ブロッコリー	ダイコン
ヨトウ・コナガ	プレバソン(フ)5	2,000倍 前日-3回	2,000倍 前日-3回	2,000倍 前日-3回	2,000倍 前日-3回
軟腐病 黒腐病	バリダシン液剤5	800倍 7日-5回	500倍 3日-3回		500倍 21日-4回

さやえんどう・実えんどう

うどんこ病は風通しの悪い場所や日陰の部分から発生する。早めに防除し、さやへの伝染を防ぐ

ナモグリバエ	パダンSG(溶) (劇)	1,500～3,000倍	前日-3回
うどんこ病	サンヨール	500倍	前日-4回

たまねぎ

- ① pH5.5～6.5を好み酸性には弱いので石灰質資材を施しておくこと
- ② 葉の先端が白く枯れる白色疫病は低湿地に発病が多いので排水を良くする

タネバエ	ダイアジノン粒剤5	3kg～5kg/10a	は種又は定植時
白色疫病	リドミルゴールドMZ	1,000倍	7日前-3回

○野菜の年特肥料紹介○

<農協取扱い銘柄>	N-P-K-Mg	予約価格	説明
『有機化成10号』	10-6-7	20kg @2,180	有機入り化成肥料で土を荒しにくい
『果菜配合3号』	5-5-5	20kg @1,980	バランスのとれた万能型配合肥料
『燐加安14号』	14-10-13	20kg @2,004	作物全般に向く一般的な高度化成。
『スーパー郷土』		20kg @196	アミノ酸、微生物、腐食が豊富。
『くみあいeco化成NH888』	8-8-8	20kg @1,361	硫安系の低コスト化成肥料。

※肥料情勢等により、供給価格が表示価格を超える場合がありますのでご了承下さい。

農薬購入時には印鑑を！ 毒劇物に指定されている農薬は(劇)と表記してあります。購入の際には必ず印鑑(認印)をご持参ください。