



長田宮農経済センターだより



発行：平成29年11月16日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.256

センター長 高橋	茶・有害鳥獣・青壮年部 海野	苺・水稻・蔬菜 山森・杉山	果樹 鈴木	女性部 小林
丸子支店購買 内野	購買 畑沢・岡部・山本・糟屋・山田			

いちご〔担当：山森・杉山〕

〔摘花〕根張り、葉面積の確保、草勢等バランスを考えて、株に応じて摘花を実施する
(目安) 頂花房 7~10個、腋花房 5~7個

〔ハウス内環境管理〕

- ・日中のハウス内の気温は25℃~27℃が適温
※できるだけ温度を保てるよう、早めの保温を心掛ける
- ・最低夜温は、紅ほっぺ・章姫は10℃、きらび香は最低夜温12℃を下回ったら保温を開始する
- ・年内の収量を増やすため、12月はできるだけ最低温度を高くするように心がける

※寒さが本格的になる前に、ハウス内の隙間や二重被覆の破れなどを補修しましょう！

〔ミツバチ管理〕

- ◎ミツバチは20~25℃で最も活発に訪花する。
- ・高温になるとハウスの上部を飛び、体力が消耗するためハウス内は30℃以上にならないようにする。
- ・厳寒期は巣箱をハウス内に設置する、または毛布でくるむ等の保温をする

〔病害虫防除〕

天敵・ミツバチへの影響日数

うどんこ病・ハダニに注意！

病害虫	農薬名	倍率	使用基準	天敵	ミツバチ
うどんこ病	ガッテン乳剤	5000倍	前日-2回	-	-
うどんこ病・灰色かび病	フルピカフロアブル	2000倍	前日-3回	○	○
灰色かび病	スミレックスくん煙顆粒	100g / 300㎡	前日-3回	○	1日
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000倍	前日-2回	○	1日
	ダニサラバフロアブル	1000倍	前日-2回	○	1日
アブラムシ	ウララDF	2000倍	前日-2回	○	1日
アブラムシ・コナジラミ	チェス顆粒水和剤	5000倍	前日-3回	-	○

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。

タマネギ〔担当：山森・杉山〕



栽培のポイント：肥料過剰と加湿環境に注意！ 腐敗病の原因となる

追肥管理：有機化成10号(10-6-7) 50kg/10a タイミング：①12月中・下旬 ②3月上旬

収穫・貯蔵について：全株の約8割が倒伏した頃。茎葉が概ね乾いたら風通しの良いところで貯蔵する

病害虫	農薬名	倍率	使用基準
腐敗病	バリダシン液剤	500倍	3日-5回
白色疫病	リドミルゴールドMZ	1000倍	7日-3回
アザミウマ類	ディアナSC	5000倍	前日-2回

水稻〔担当：山森・杉山〕

土づくり資材：ケイ酸を施用し、倒伏防止・食味向上を図る。また、高温障害の軽減も期待できる
下記の3資材の中から1つを施用する。

資材名	施用量(10a)	備考
オイスターミネラル	5袋	新規銘柄。カキ殻の石灰とケイ酸のW効果。
けい酸加里プレミアム34	2~3袋	ケイ酸34%と高く、加里も20%含有する
とれ太郎	3袋	施用量の少ない省力的な資材
ワラ分解キング	1袋	年内に使用することで糞の分解を促進し、浮き糞防止、ケイ酸を戻す

茶〔担当：海野〕

【防除】チャトゲコナジラミ

特徴	年3~4回発生(5月・7月・8~9月・10~11月) ※ 繁殖率が高いため、急速に地域全体に拡散します
被害	幼虫の密度が高い(大発生する)と、すそ部に「すす病」(古葉が黒くなる)が生じます
防除	12~2月にかけてトモノールSなど(75~100倍) ※ 400g/10a 幼虫・卵のいる、すそ葉・葉裏を重点に散布してください。 ※ マシン油を2回散布することで防除効果があがります 2回散布する場合1ヶ月以上間隔をあけてください また、マシン油は水に流されやすいため、晴天が2~3日続くときに散布して下さい ※ 赤焼病が助長される恐れがあります。

【防除】灰色カビ病

- この時期に気温が高く(発病適温15~18℃)、降雨が多いと発生が心配されます。また、着花の多い茶園ほど発生が多くなります。下記の薬剤を散布してください。
開花盛期または落弁期に、フロンサイドSC [2000倍] またはベフドー [500倍]

柑 橘 〔 担当：鈴木 〕



＊青島温州の収穫・予措

今年のみかんは、10月に雨が強く糖度酸度とも低く体質が弱い状況で、浮皮やイタミが心配されます。収穫は着色の良い物から浮皮果になる前に早めに収穫しましょう。収穫後は、貯蔵性を高めるために1～2週間（果実重3～4%減らす）予措を実施しましょう。また、夏季の乾燥の影響か結果量の多い樹で樹勢の劣る樹にコハン症が発生しています。選果に注意してください。

＊病害虫防除

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 率	使用基準
柑 橘 類	収穫7日前 ～前日	貯蔵病害 (混用散布)	ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日～2回
			ベンレート水和剤	4000倍	前日～4回
中晩柑類	収穫10～ 20日前	へた落ち防止	マテックEW	3000倍	1回
はるみ 不知火	着色終期	水腐れ軽減	ジベレリン (果実散布)	0.5ppm	収穫7日前

⑨ベフラン液剤は、購入の際印鑑が必要です。

落葉果樹 〔 担当：鈴木 〕

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	使用倍数
桃	12月上中旬	越冬害虫 カイガラムシ類・ダニ	マシン油乳剤97% (トモノールS)	50倍
梨	12月上旬	越冬病害虫		
キウイ	12月中下旬	越冬病害虫	マシン油乳剤95% (トモノール)	12～14倍
イチジク				
柿	12月中下旬	越冬病害虫	マシン油乳剤97% (トモノールS)	50倍
	落葉病・うどんこ病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する			
梨・キウイ・柿	越冬病害虫対策	粗皮削り (罹病部を削り取り保護剤を塗布)		

※多種類の果樹に散布する場合は、マシン油乳剤95% (トモノール) を使用する

【マシン油乳剤の散布注意】

・マシン油乳剤は混用時に、水と良く混ぜ合わせてください。水が白濁し、時間を置いても水面に油が浮いて来ない状態が適正です。

＜要注意＞ 蓋(キャップ)を水洗いしないこと。残った原液に水が一滴でも入ると保存が出来なくなります。

～ お知らせ ～

青色専従者相談会について

会場月日 丸子支店 平成29年12月21日(木) ※丸子支店は午前の部のみ
下川原支店 平成29年12月26日(火)
長田支店 平成29年12月27日(水)
時 間 午前の部 10:00～11:30
午後の部 13:00～14:00

持ち物
平成29年度源泉徴収簿・納付キップ・通帳(事業主)通帳印・
筆記用具・マイナンバーカード又は通知カード・身分証明書
※ マイナンバーカード又は通知カード・身分証明書は給料受給者と支払者両者分必要となります。

H28年度分・固定資産台帳利用料徴収について

固定資産台帳の利用料を下記の通り口座より徴収させていただきます。
予定：平成29年12月20日(水) 金額：1,500円

購買からのお知らせ



- ・お正月用品受け付け中！！
申込み締め切り 12月4日(月)
申込み先 長田営農経済センター購買 または 最寄の支店まで
- ・農業用塩化ビニール回収のお知らせ
日 時 12月12日(火) 午前8:30～11:00まで
場 所 長田支店 駐車場

平成30年度肥料年間特別予約の注文お早めに！

1袋からのでも注文可能です！
ご注文お忘れの方、追加注文される方は是非ともお得な予約注文
をご利用ください♪

〔有害鳥獣駆除実施期間について〕

駆除期間 平成29年11月1日～平成29年12月26日まで
駆除範囲 高草山保護区内(静岡市内)
駆除対象 イノシシ・ニホンジカ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ・ニホンザル
本年度10月31日時点での捕獲頭数 イノシシ 68頭 ハクビシン 6匹

