

東部営農経済センターだより 1月号

JA静岡市東部営農経済センター TEL: 245-7527

センター長	女性部	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	購買	東部配送
海野	大越	深井	川島・山梨	大塚	望月・安本	田山

【柑橘】

- 状況 年明け青島みかんの出荷が始まりましたが、本年の青島みかんは着色が遅い状態です。また、中晩柑については、例年よりも酸が高い傾向です。今後の管理については、果実内容を見ながら適期の収穫を行って下さい。
- 果実分析結果 全園地平均 (1月10日)

品種名	平成29年度平均		平成28年度平均		平成27年度平均	
	糖	酸	糖	酸	糖	酸
スルガ	9.6	1.81	9.5	1.63	9.9	1.76

- 防除 1月中旬までにマシン油の散布が出来なかった園地については、3月に散布して下さい。1月下旬から2月の散布は、落葉を促す原因となります。
- 土壤改良 新根の発生を促進させ樹勢維持をさせるために、堆肥等の有機物を投入します。また、PHの補正のため苦土セルカ2号を10袋/10a施用。
- 間伐/整枝・剪定 剪定よりもまず間伐。日当たり・作業性を考えて1本おきにする。特にスルガエレガントの10年以上の園地では、間伐が必要です。温州においても、密植園が増えてきましたので、間伐を実施して日当たりを良くしましょう。また、軽い剪定で枝が混んでいるので、枝を間引きましょう。整枝・剪定の時期としては、寒さが緩む2月下旬から実施する事が望ましいです。枯れ枝は、黒点病の発生源になるので徹底して除去する事。また、中晩柑の夏芽処理を実施し、カイヨウ病の発生を少なくします。

第26回JA静岡市貯蔵みかん・ポンカン品評会結果

【貯蔵ミカンの部】	【ポンカンの部】
2等 太田泰弘 様	1等 渡辺伸夫 様
3等 太田寿美子 様	

★入賞おめでとうございます★



【落葉果樹】

- 剪定：剪定が終わっていない園地は、早期に実施して下さい。
- 土壤改良：苦土セルカ2号 10袋/10a キウイフルーツ・いちじくは地力維持向上と細根の発根促進を図り樹勢維持のために、堆肥等の有機物の投入。また、PHの補正のため土壤改良材を施用します。

茶

- 土壤改良資材 1月下旬～2月中旬 苦土セルカ2号 等 10a当 5袋
- 春肥 (1回目) 2月中旬 配合肥料 10a当 5袋
(2回目) 3月上旬 配合肥料 10a当 5袋
※肥効を高める為に、施肥後は必ず中耕しましょう。

- 化粧ナラシ 2月下旬～3月上旬 遅れ芽や立ち葉を取り除く程度とし、越冬芽に刃がかからないように注意して下さい。
- 防除 赤焼病 2月下旬 ドイツボルドーA 500倍 (14日) ※例年発生が見られる園は予防として防除して下さい。
カンザワハダニ (赤ダニ) 3月中旬 バロックフロアブル 2,000倍 (14日) ※ダニは葉裏やスノ葉に多くいるので、薬剤がしっかりかかるよう散布する。

ばれいしょ ナス科のため、トマトやナスなどとの連作は避けましょう。

- ① 種イモの準備…15～20 kg/1 aの種芋を準備。

- ② 畑の準備

みのり堆肥	100 kg/1 a
燐加安 14号	7 kg/1 a

『そうか病』はアルカリ土壌で発生しやすいので石灰の施用は控えるが、土壌が酸性 (pH5.5以下) の場合はセルカ等の石灰資材を10～15 kg/1 a程度施用する。

- ③ 病害虫予防


ケラ・ネキリムシ類	ダイアジノン (粒) 5	400～600 g/1 a	植付前	全面土壌混和
そうか病	フロンサイド (粉)	3～4 kg/1 a	植付前	全面土壌混和

- ④ 植えつけ… 株間：25～30 cm / 深さ：10 cm
大きい芋は40～50gとなるよう、芽を分けて切って植えつける。
(切った場合は傷口を乾燥させてから切り口を下にして植えつける)

合併25周年記念

静岡市 生活事業

大感謝祭



会場：JA静岡市本店特設会場

日時：平成30年1月27日 (土) 10:00～17:00

1月28日 (日) 10:00～16:00

☆お楽しみ抽選会☆…スタンプラリーで抽選 (来場者全員)

1万円以上お買上げの方は別途抽選会があります!

☆南部じまん市☆…来場者 1,500万人記念セール同時開催

主催	JA静岡市農業協同組合
協賛	購買利用研究委員会・JA静岡市女性部
後援	JA静岡経済連・JA静岡市提携業者

ふわふわ遊具・サイコロゲーム

27日・28日
本店前ロータリー
10:00～15:00



いちご

1月に入り寒さが厳しくなり、1か月予報では2月中旬までの平均気温はほぼ平年並みとなっています。毎日の管理、またご自身の体調管理に十分ご注意ください。

1、株管理

- ・ 高設栽培では排水量とECのチェック。
- ・ 収穫が終わった花房の除去、垂れた葉の摘葉、次果房の摘果
- ・ 温度管理 日中の温度は27℃～28℃ 午後は25℃（果実付近の実測で）
☆重油代も気になりますが、1月いっぱい最低気温設定7～8℃で。



2、ミツバチ管理

☆管理上の注意☆

- ① 農薬散布は影響の少ない物を選ぶとともに、必ず前日の日没後にハウスの外へ出す。換気窓を開けておくが、低温、高温になる場所は避けて管理する。
- ② 巣箱の位置は変えない。必ず元の位置へ戻す。
- ③ 巣箱内の温度は常に33℃～34℃に維持されるので、厳寒期は毛布を掛けて保温する。また、日中、高温になりすぎないように、直射日光を避ける。
- ④ 厳寒期はエサの与えすぎに注意する。3月までは2週間に1回150cc程度（餌を与えすぎると、巣に溜めこみ産卵場所がなくなるため）



3、病害虫防除

① ハダニ

薬剤名	倍率	回数	日数	蜂	天敵	備考
ニッソラン（水）	2,000～3,000倍	2回	前日	1日	◎	殺卵
マイトコーネ（フ）	1,000倍	2回	前日	1日	◎	全ステージ
エコピタ液剤 ※1	100倍	—	前日	1日	△	成虫・幼虫
カネマイト（フ）※2	1,000～1,500倍	1回	前日	1日	◎	全ステージ

※1、気門封鎖効果の展着剤又はエコピタは、多少天敵に影響があります。
※2、薬害注意。混用は避け、気温の低い時間、薬剤が乾く条件で散布する。

② スリップス

厳寒期に月1回の防除を行きましょう。

薬剤名	倍率	回数	日数	蜂	天敵	混用（例）
マッチ（乳）	1,000～2,000倍	4回	前日	1日	◎	ポタニガードES 1,000倍
スピノエース（顆水）	5,000倍	2回	前日	3日	△	
カスケード（乳）※	4,000倍	3回	前日	1日	○	

※ミヤコカブリダニの卵に対して影響あり

③ うどんこ病・灰色かび病


薬剤名	倍率	回数	日数	治療	予防	備考
アフェット（フ）	2,000倍	3回	前日		○	
アミスター20（フ）	1,500倍	3回	前日	○	○	薬害注意
フルピカ（フ）	2,000～3,000倍	3回	前日		○	

平成29年分 税務関係（確定申告）

※ 申告者はマイナンバーの記載が義務付けられていますので、申告者の方は、必ずマイナンバーカード又は、通知カードと身分証明書（免許証・保険証等）をご持参ください。
配偶者・扶養・専従者に該当する方のマイナンバーの記入もありますので必ずご持参下さい。

1、申告時に必要な物（要確認） ※ 該当する場合

- ① 医療費の領収書 【生計を共にしている者（同居家族）】⇒本年改正下記参照
※高額医療申請で支払われた金額を事前に確認
- ② 社会保険料の証明書（ハガキ）
国民健康保険料・国民年金・農業者年金・介護保険の保険料明細書
- ③ 小規模企業共済（領収書又は証明書）
- ④ 生命共済・損害共済証明書（申告者名の証明書）
- ⑤ 前年で還付申告をされ、税務署よりその内容が記載されたハガキ
- ⑥ 保険等で満期になり一時所得の発生がある場合⇒内容が解かる書類
- ⑦ 住宅所得控除の申請関係書類
- ⑧ 固定資産台帳（減価償却費）⇒建物・機械等
- ⑨ 固定資産台帳（名寄台帳）⇒土地・建物への税金
- ⑩ 収入になる源泉徴収票（給与・年金等）
- ⑪ 家族の生年月日が分かるもの、印鑑、通帳、障害者手帳等
- ⑫ その他、税務署から送られてきた書類・ハガキ等



2、申告の前に実施して下さい

- ① 上記内で（申告時に必要な物）紛失等で無い場合は、関係機関への問合せ
- ② 医療費の領収書の計算（総金額の計算）
- ③ JAで固定資産台帳を登録している方で新規購入がある場合は、事前に送付した用紙に必要事項を記入し最寄りの支店に提出下さい。

お知らせ：

医療費控除の申請方法が変わりました！

平成29年分の確定申告から、医療費控除は、領収書が提出不要になりましたが『医療費控除の明細書』添付が必要となります
※ 医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。

医療費控除を受ける方へのお願い

医療費の申請に関しては、事前に下記の通りに分けて集計をお願いします。

- ① 個人毎に領収書の集計をする
※申告者本人・他家族（妻・子・父・母）毎に分け集計する
- ② 病院名毎集計する。（領収書発行者名毎分ける）
※病院と薬局が別の場合も分ける

☆詳しくは、国税庁HPをご確認下さい。

※収支計算準備については、先月営農便りをご確認下さい。

