

# 南の風だより 2月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3  
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

センター長	湯本	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	後藤・池田亜沙美	水稻・野菜・苺	海野・池田里奈・古井	配送員	立花・松風・正込

## 水稻

ケイ酸には倒伏防止・食味向上の効果があります！  
また、ケイ酸は水稻にとって最も多く必要な養分です！

### 1. ケイ酸資材の施用

珪力燐	6~8袋	ケイカル・リン酸の補給
オイスターミネラル	5袋	カキ殻によりケイ酸の吸収率UP、
けい酸加里プレミア	2~3袋	ケイ酸、カリの他、苦土、ホウ素、石灰、鉄を含む
とれ太郎	3袋	省力型肥料で、リン酸、苦土、ケイ酸、石灰を含む

### 2. その他土づくり資材の施用

ようりん	40~60kg/10a	土壌の有効リン酸を高める
ワラ分解キング	10kg/10a	稲藁の分解を促進する
アツミン	30~50kg/10a	リン酸などの肥効を高める

## いちじく

- 敷藁 3~4月にかけて実施する。(雨による病原菌の跳ね返りを防ぎます)
- 病害虫防除

3月	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7倍	発芽前
----	-------	--------	----	-----

## 柑橘

### 1. 春肥の施用(早生温州・青島温州)

3月中旬	みかん80ペレット	早生温州5袋、青島6袋/10a	施用後中耕する
------	-----------	-----------------	---------

### 2. 病害虫防除(スルガエレガント・中晩柑)

3月上旬 剪定直後	ミカンハダニ	マシン油乳剤	60倍	1月 無散布園のみ
	カイガラムシ類			
3月下旬 発芽直前	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	マシン油乳剤との散布は前後14日間以上あけること。 発芽期以降、散布しない。(落葉)

## 茶

### 1. 病害虫防除

3月中旬(萌芽前)	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	14日
-----------	---------	-----------	--------	-----

### 2. 施肥

2月中~下旬	春肥1回目	農協茶配合肥料	5袋/10a
3月上~中旬	春肥2回目	農協茶配合肥料	5袋/10a

## JA静岡市グリーンティーフォーラム2018

日時 平成30年3月23日(金) 13:30~16:30  
場所 グランシップ11階 会議ホール「風」  
内容 ①各種表彰 ②基調講演



## 平成30年度「茶誌」「柑橘誌」新規申込み・継続について

### (参考)

・茶誌 6,600円(税込) 購読期間: H30.4月号 ~ H31.3月号  
・柑橘誌 5,000円(税込) 購読期間: H30.5月号 ~ H31.4月号

## やさい

気温の上昇とともに病害虫の発生も多くなります。  
早期防除、病気は予防散布を心がけましょう！

### 1. タマネギ

- 病原細菌は雨風によって葉に損傷を生じると感染・拡大する事が多いので気象情報に注意して、予防散布又は、雨風がおさまったら薬剤散布を行い防除する。
- 追肥は2月下旬~3月中旬までに行う。4月以降は腐敗を増加させる可能性があるため注意！

腐敗病・軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日-5回
灰色腐敗病・灰色カビ病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日-4回
アザミウマ類	ディアナSC	2,500倍	前日-2回

### 2. さやえんどう(スナック・きぬさや)

うどんこ病	トリフミン水和剤	5,000倍	前日-5回
ハダニI類・アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-2回

### 3. 未成熟そらまめ

マメハモグリバエ	カスケード乳剤	2,000倍	前日-3回
ハダニI類・アブラムシ類	アディオン乳剤	3,000倍	7日-3回

※ 農薬の毒劇物の表記について: 農薬名の横に☉や☼で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

4. ほうれんそう

べと病	アリエッティ水和剤	1,500倍	前日-2回
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	3,000倍	3日-2回

春夏野菜の植付にあたり、連作障害の発生を抑えるため下記の事に注意しましょう！

○連作障害回避期間のめやす

年	野菜の種類
1年休閑	ほうれんそう、コカブ、いんげんまめ
2年休閑	レタス、はくさい、きゅうり、ニラ、パセリ
3~4年休閑	なす、トマト、ピーマン、さといも、ブロッコリー、ソラマメ
4~5年休閑	エンドウマメ、スイカ、メロン、しょうが
発生しにくい	かぼちゃ、ズッキーニ、たまねぎ、ねぎ、にんじん

○同じ仲間の野菜を連作しない

ナス科	なす、トマト、ピーマン、ししとう、じゃがいも
ウリ科	きゅうり、かぼちゃ、ズッキーニ、スイカ、メロン

いちご

1. 栽培管理

- (1) 収穫終了後の果房、古葉は早めに除去する。
- (2) 1果房3果を目安に摘果する。(草勢をみて調整する。)
- (3) 3月に入ると日射量が増え、灌水量が不足することがあるので注意する。  
※特に高設栽培では廃液量のチェックを行う。(廃液率30%程度)



2. 病害虫防除

(1) 灰色かび病・うどんこ病

病害	薬剤	使用基準		備考
灰色かび病	フルピカフロアブル	3,000倍	前日-3回	うどんこにも効果
	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	前日-3回	
うどんこ病	ガッテン乳剤	5,000倍	前日-2回	
	カリグリーン	1,000倍	前日-なし	高温で薬害注意
	アフエットフロアブル	2,000倍	前日-3回	灰カビにも効果

(2) アザミウマ・アブラムシ・ハダニ



アザミウマは、ハウス内で越冬したものが急激に増殖し始めています。果実の被害が出てからでは手遅れです。発生初期の防除を徹底して行いましょう！

※ 農薬の毒劇物の表記について：薬名横に(毒)や(劇)で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

薬剤	使用基準		アザミウマ	アブラムシ	ハダニ	入蜂	天敵
	倍率	回数					
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日-2回	○			3日	○
マッチ乳剤	2,000倍	前日-4回	○			1日	◎
ウララDF	4,000倍	前日-2回		○		1日	◎
チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日-3回		○		1日	◎
カネマイトフロアブル	1,500倍	前日-1回	新葉薬害注意		○	1日	◎
エコピタ液剤	100倍	前日-なし		○	○	1日	○

**JA静岡市**  
**いちご果実品評会**  
平成30年1月19日開催  
南部支部抜粋

2等 小澤 泰久様 (紅ほっぺ)  
2等 増田 安昭様 (きらび香)  
3等 増田 安昭様 (紅ほっぺ)

---

**JA静岡市**  
**いちご園地共進会**  
平成29年12月13日・平成30年2月6日開催  
南部支部抜粋

静岡市長賞  
優等 小澤 保彦様  
3等 小澤 泰久様

ご入賞おめでとうございます

平成30年度農業近代化資金日程

回次	取扱対象案件	利子補給承認日 及び 貸付実行可能日	償還日 (例示)	静岡市特別融資 制度推進会議 (審査会日)	審査資料締切
3	7月2日 ~ 7月26日	平成30年7月2日	2月10日 4月20日 8月15日 10月5日	平成30年5月18日	平成30年4月23日
4	7月27日 ~ 8月28日	平成30年7月27日			
5	8月29日 ~ 9月26日	平成30年8月29日		平成30年7月20日	平成30年6月27日
6	9月27日 ~ 10月29日	平成30年9月27日			
7	10月30日 ~ 11月28日	平成30年10月30日		平成30年9月21日	平成30年8月29日
8	11月29日 ~ 1月3日	平成30年11月29日			
9	1月4日 ~ 1月29日	平成31年1月4日		平成30年11月22日	平成30年10月30日
10	1月30日 ~ 2月26日	平成31年1月30日			
11	2月27日 ~ 3月26日	平成31年2月27日		平成31年1月21日	平成30年12月20日
12	3月27日 ~	平成31年3月27日			

※事前の書類作成がありますので利用されるかたは審査資料締切2週間前には営農センターへご連絡ください