

南の風だより 3月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

センター長	湯本	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	後藤・池田亜沙美	水稲・野菜・莓	海野・池田里奈・古井	配送員	立花・松風・正込

水稲

ケイ酸資材の施用：倒伏防止等のためいずれかの資材を施用する

珪力燐	6~8袋/10a	混合りん肥で吸収しやすく、土に固定されにくい。
農力アップ	5袋/10a	ケイ酸の溶出率が高く、老朽田の秋落ちに効果。
けい酸加里	2~3袋/10a	施肥しやすく、緩効性で肥効が長続きする。
とれ太郎	3袋/10a	吸収されやすいケイ酸なので10aあたりの施肥量がすくない。(省力的)

野菜

さやえんどう(キヌサヤ・スナック)

ナモグリバエの被害は、3月頃から発生するので早めに薬剤散布をしましょう。防除が遅れると、発生を止められず、下葉から枯れあがってしまいます。被害を受けた葉以外の葉にも産卵されている可能性が高いので、全体に散布する。

うどんこ病	サンヨール乳剤	500倍	前日-4回
ナモグリバエ	アディオオン乳剤	3,000倍	前日-3回
ハモグリバエ類	プレバソフフロアブル	2,000倍	前日-3回

未成熟そらまめ

ソラマメは気温の上昇する3月からアブラムシがつきやすく、ウイルス病葉が縮む)を媒介するので、早めの防除を心がけましょう。

アブラムシ類	アディオオン乳剤	3,000倍	7日-3回
--------	----------	--------	-------

たまねぎ

べと病は葉の光沢がなくなり、途中から黄色く変色してきます。春先の雨による感染が多いので、降雨前後の予防が効果的です。

べと病・白色疫病	ランマンフロアブル	2,000倍	7日-4回
	リドミルゴールドMZ	1,000倍	7日-3回
ネギアザミウマ	コルト顆粒水和剤	2,000倍	前日-3回

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

ほうれんそう

べと病は、黄色の斑点と葉裏の灰色のかびが目印です。病気の葉を取り除いてから、発生場所を中心に薬剤を散布しましょう。

べと病	アリエッティ水和剤	1,500倍	前日-2回
アザミウマ類	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	前日-2回
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	3日-2回

きゅうり ウィルス病を媒介する害虫に注意し、予防的に防除を行いましょう。

薬剤名	倍率	使用時期	回数	アザミウマ類	コナジラミ類
プリロッソ粒剤	2g/株	育苗後半~定植時	1回	○	○
モベント(フ)	2,000倍	前日	3回	○	○
ディアナSC	2,500倍	前日	2回	○	○
コルト顆粒(水和)	4,000倍	前日	3回		○
プレオ(フ)	1,000倍	前日	2回	○*	
ダントツ(水溶)	2,000倍	前日	3回	○*	○

※ミナミキイロアザミウマ

えだまめ

普通栽培では、4~5月に播種をする早い作型に早生品種、5~6月に中生品種、6~7月の遅い作型に晩生品種を用います。晩生種を早まきすると、莖葉だけが繁茂し着莢が悪くなります。

~おすすめ品種~

- ★サッポロミドリ…極早生白毛系。粒が大きくびっしりなる見栄えのよさが最大の特長です。
- ★おつな姫…茶豆風味で食味良好。白毛の大莢で多収品種。早生品種
- ★湯上り娘…茶豆特有の甘味と芳香がある。茶豆だが毛茸は白く、豆は緑。中早生種。

柑橘

青島温州

4月中旬	ハダニ類	マシン油97%	100倍	3回
	カイガラムシ類	アブロードフロアブル	1,000倍	30日-3回
	そうか病	マネーシDF	4,000倍	30日-3回

スルガエレガント

4月中旬	ハダニ類	マシン油97%	100倍	3回
	カイガラムシ類	アブロードフロアブル	1,000倍	30日-3回

※ マシン油は、3月下旬にボルドー剤を散布した場合、間隔を14日以上あける。

年度末決算棚卸のため、変更いたします。
ご理解・ご協力をお願いします。

購買店営業時間のお知らせ

3月30日(金)
 ・各支店購買窓口 午後3時まで
 ・南部営農経済センター 正午まで

3月31日(土)
 休業
 休業



茶

カンザワハダニ ⇒ **バロックフロアブル【2000倍・14日】**
 <<防除効果>>殺卵・殺幼虫が主 (散布により成虫が卵を産んでもふ化を抑制します。)
 ※チャトゲコナジラミが多発生している茶園はダニゲッターフロアブル 2000倍・7日
 ☆特に裾部や道路端部の発生に注意し、散布は丁寧に行なってください。

お知らせ

「茶栽培作業記録用紙(防除・施肥)の提出について」

- ◎ 対象者 : 荒茶共販出荷者
- ◎ 提出期日 : 摘採を予定する5日~1週間前
- ◎ 提出物 : 栽培作業記録用紙(防除・施肥)
- ◎ 提出場所 : 最寄りの支店又は南部営農経済センター
 ※用紙が足りない

いちご


1. 今後の管理

- (1) 垂れ下がった下葉と芽の整理を行ない、株元の風通しを良くする。
- (2) 果房あたり3果を目安に摘果する。芽数が多い場合は、草勢をみて調整する。
- (3) 日射量の増加や気温上昇に伴い、灌水量は適宜増やし、必要に応じて液肥や葉面散布をする。
- (4) 急激な温度の上昇が予想されるので、ハウス内が28℃以上にならないように注意する。



2. 病害虫防除

灰色かび病、うどんこ病の発生がみられます。ハウス内の換気を心がけましょう。



・うどんこ病・灰色かび病

薬剤	倍率	使用基準	うどんこ	灰色かび	備考
ガッテン乳剤	5,000倍	前日-2回	○		
ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日-3回		○	
スミレックスくん煙顆粒	100m ³ /6g	前日-3回		○	
アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回	○	○	
カンタスドライフロアブル	1,000~1,500倍	前日-3回		○	※

※機能性展着剤(ミックスパワー・アプローチBIなど)は葉害の恐れがあるので加用しない。

・アザミウマ類

薬剤	倍率	使用基準	成虫	幼虫	入蜂	カブリダニ
モベントフロアブル	2,000倍	前日-3回		○	1日	×
ディアナSC	2,500倍	前日-2回	○	○	3日	不明
マッチ乳剤 (IGR剤)	1,000倍	前日-4回		○	1日	○

3. 親株の管理

- (1) プランター等の資材は、イチバン(500~1,000倍、瞬時浸漬)で消毒してから使用する。
- (2) 培土は、新しいものか、土壌消毒してあるものを使用する。
- (3) 親株には無病苗を利用し、定植時には粒剤(モスピラン、アドマイヤー等)処理をする。
- (4) 紅ほっぺは、章姫よりも親株の定植適期が早く、肥料と水分を必要とする。
- (5) 親株は、3月下旬~4月上旬に定植する。
- (6) 活着後、IB化成S1号6粒/株を追肥し、肥切れに注意する。(きらび香は8粒/株)

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に(毒)や(劇)で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)


水稻作業標準料金表(荒越こし~田植)

税込価格

作業名	単位	料金	備考
荒越こし	10a	16,632円	3月以降
崩し再耕	10a	11,880円	
代かき	10a	16,200円	
田植(機械植え)	10a	11,880円	植え付けのみ

有害鳥獣(イノシシ)駆除実施中!

駆除期間：平成30年3月31日(土)まで
 実施地区：有度山・久能山鳥獣保護区
 対象鳥獣：イノシシ
 駆除方法：駆除員による、罠及び銃器使用による駆除
 注意事項：罠の周辺には安全確保のため標識を設置してありますが、入山の際にはくれぐれもご注意ください。



ハクビシン等駆除について

ハクビシン等の被害にお困りの方は南部営農経済センターまでお問い合わせください。
 なお、トラバサミ等の設置は法律で禁止されていますのでご注意ください。

平成30年度静岡アグリ実践大学受講生募集!

開催期間：平成30年5月から平成30年12月まで(全18回)

対象者：静岡県内で就農を目指す方(63歳以下の方)

定員：15名(選択したコースのみ受講できます)

受講料：無料。ただし、教科書等は実費負担あり。

募集期間：平成30年4月2日(月)

☆☆詳しくは営農センターまで☆☆

