



センター長	杉山	茶・柑橘	小澤	女性部	横山
購買	後藤・中村・渥美	水稻・野菜・苺	川島・海野・古井	配送員	末永・立花・松風(米)
購買地区担当	海野(東豊田・豊田) ・ 栗田(久能・大谷) ・ 鷺津(高松・大里)				

水稻

1. 元肥の施用(10aあたり)

コース	ひとめぼれ	キヌヒカリ	コシヒカリ	あいちのかおり	その他品種
省力	ユ-コート666 2.5袋	ナイスアップシカ 3袋	エココシ18号 2袋	エムコート045 2袋	ナイスワンプワー 2.5袋
化成	マップ202 1.5袋	マップ202 2袋	マップ202 1袋	マップ202 1袋	マップ202 2袋
配合	-	-	-	-	もどこえペレット 3袋

※ 今年から元肥、穂肥エースはマップに変更になりました。  
化成肥料は、田植前1週間以内の施用とする。(特に、省力コースでは注意する)  
また、元肥一発タイプの肥料はよく混ぜ込んで施用するようにしてください。

2. 田植期の防除

いもち病 重点	Dr.オリゼパティート粒剤	50g/箱	緑化期～田植当日
紋枯病 重点	フルターボ箱粒剤		田植3日前～当日
低コスト	ツインターボ箱粒剤08		播種時～当日

※ 効果低減を防ぐため、散布ムラにならないように注意する。

3. 田植機の調整

- 植付株数：70株/坪 にこまる：60株/坪  
(高温障害の回避、分けつのとれない場合は80株/坪)
- 植付本数：3～4本/株 (早く分けつし、太い茎をつくる)
- 植付深さ：2～3cm (浅植えにし早期の活着や茎数の確保を促す)

4. 水の管理

- 田植後～活着：水深4～6cm程度の深水とし、活着を促す。  
※ 注意：ジャンボタニシの食害が危惧される場合は浅水管理とする。
- 活着後：水深2～4cm程度の浅水とする
- 田植2～3週間後にガス抜きをする場合は、1～2日間落水する。

5. スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)

- 本田や水路で越冬した貝が、5月下旬から活動を開始して田植後の稚苗を食害します。
- 水路の貝が取水口から侵入するので、取水口に網を張る。
  - 水深1cm以下では、ほとんどの貝は稲を食害できないので、田植後2～3週間は水深4cm以下の浅水管理とする。
  - 例年発生が多い水田は次の薬剤を発生初期に施用する。

スクミリンゴガイ	スクミノン	4kg/10a	収穫60日前-2回
----------	-------	---------	-----------

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や☜で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

6. 除草剤

★ 除草剤を上手に効かせるために ★

- 代かきはていねいに行い、田面を均平にする。
- 薬剤の処理時から7日間は水尻を閉じ、かけ流しにしない。
- 処理後、田面が露出しないように水管理をする。(例外：ガス抜き)
- 雑草の多い水田や、水もちの悪い水田では、体系処理で除草を行う。
- 処理後は田に入らない。(足跡に雑草が発生する)

一発処理の場合(10aあたり)

田植後	フォーマット1キロ粒剤51	1kg	移植後30日まで ノビエ3葉まで
	ウィナー1キロ粒剤51	1kg	移植後30日まで ノビエ2.5葉まで
	キマリテ1キロ粒剤	1kg	移植後30日まで ノビエ3葉まで
	キクトモ1キロ粒剤	1kg	田植後～12日頃 ノビエ2.5葉まで
	ガンガン豆つぶ250	250g	田植後3日～30日ノビエ2.5葉まで
	ミスターホームランLジャンボ	500g	田植後3～10日 ノビエ2葉まで

体系処理の場合(10aあたり)

田植前	サキドリEW	500ml	代掻き時は田植えまで7日間あける。田植後は田植直後に使用する。(どちらか1回)
田植後	一発処理体系中の1キロ粒剤を使用する	1kg	田植後15～20日頃

☆中干頃にも除草剤を散布する。(次号で詳細を掲載します)

その他

アオミドロ 浮き草	モゲトン粒剤	3kg/10a	部分施用も可
--------------	--------	---------	--------

**注意！！ きぬむすめ縞葉枯病について**  
近年、静岡市南部地域で、きぬむすめに縞葉枯病が発生しています。縞葉枯病に登録のある箱粒剤では防ぎきれない場合があるため6月下旬～7月上旬にかけてトレボンまたはスタークルの使用を推奨しています。\*問い合わせ：南部営農センター海野まで

静岡市いきいき都市農業推進事業(新設)

市街化区域内で農業を営む方への支援事業が新しくなりました。  
補助金額：施設・機械の導入経費の1/2(上限30万円)  
対象者：H29農業収入50万円以上の方  
市内の市街化区域内の農地で農業を営む方

市街化農地で農業を営む方  
農機具等の購入を検討の方

電気柵等野生鳥獣害防除資材の補助制度

ハクビシンやイノシシなどから畑の農作物を守るために設置する電気柵やネット等の購入に対し静岡市とJAより助成金が交付されます。

個人：資材費の70%(7万円以内)  
団体：資材費の90%(戸数×10万円以内)

問い合わせ：南部営農経済センター

かんきつ（病害虫防除）

☆青島温州

6月中旬	ミカンハダニ	マシン油（97%）	150倍	3回	混用可
	かがらみ類 チャノアザミ	アドマイヤー 顆粒水和剤 <sup>㊟</sup>	10,000倍	14日-3回	
	黒点病	エムダイファー（水）	600倍	60日-2回	

※施肥：夏肥は満開から6月20日までに、  
（青島）みかん50ペレット8袋/10a又はみかん化成1号5袋/10a  
（早生）みかん化成1号4袋/10a

☆スルガエレガント・中晩柑

6月上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	-
------	-------	-----------	-----	---

※ ICボルドー412 に関してはお取り寄せになりますのでご了承ください。

6月中旬	ミカンハダニ	マシン油（97%）	150倍	3回	混用可
	チャノアザミ	アドマイヤー 顆粒水和剤 <sup>㊟</sup>	10,000倍	14日-3回	
	黒点病	エムダイファー（水）	600倍	90日-2回	

※施肥：夏肥は6月上旬に、（スルガ）スルガペレット8袋/10a  
（ボンカン）みかん50ペレット6袋/10a

茶（病害虫防除）

二茶萌芽期	炭そ病 もち病	オンリーワン（フ）	2,000倍	混用 7日
	ウソカ スリップス	ウララDF	1,500倍	
二茶整枝後	ハマキムシ類	サムコル（フ）	2,000倍	単用 3日
	輪斑病	アミスター20（フ）	2,000倍	単用14日

・「チャトゲコナジラミ」又は「サビダニ」の発生が見られる茶園ではウララDFの代わりに  
㊟「コテツフロアブル」（2000倍・7日）を散布してください。

・アミスター20（フ）の散布は整枝後、速やかに散布する。

「クワシロカイガラムシ」（防除時期・5月中下旬頃）※地区によって適期が異なります。  
⇒カイガラムシがいる枝を南部営農経済センター又は最寄りの支店へ持ってきていただければ適期を調べます。

- ・コルト顆粒水和剤（2,000倍・7日）・㊟スプラサイド乳剤（1,500倍・14日）
- ・アプロードエースフロアブル（1,000倍・14日）

土の健康診断

土壌分析実施のお知らせ（野菜・莓・花卉）

分析希望の方は、風乾しふるいがけした土200gを、『氏名・電話番号・作物名・施設/露地』  
を明記の上、最寄りの各支店購買窓口または南部営農経済センターまで提出して下さい。

締切り：平成30年6月15日（金）



※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に㊟や㊟で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。（普通物は、特に表記してありません。）

野菜

◎梅雨の時期は高温多湿になりやすい為、病害が出やすくなります。発生すると  
なかなか治まらないので、銅剤等で予防を心掛けた防除を行ってください。

トマト・ミニトマト

葉かび病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒（水）	2,000~3,000倍	前日-3回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナSC	2,500倍	前日-2回

☆尻腐れ予防…カルクロン 200倍 各花房の第1花が開花したときに散布する。

☆着果促進 …トマトトーン 100倍 花房の3~5花が開花した時に1花房に1回散布する。  
芽や幼葉にかかると葉が萎縮するので、花・花房のみにかかるよう噴霧する。

きゅうり

べと病・褐斑病（予防）	ジマンダイセン水和剤	600倍	前日-3回
アザミウマ類・コナジラミ類	ディアナSC	2,500倍	前日-2回
	モベントフロアブル	2,000倍	前日-3回

未成熟とうもろこし

アワノメイガ 雄花抽出時~	プレバソフロアブル	2,000倍	前日-3回
	デナボン粒剤5	4~6kg/10a	21日-2回
アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回

☆アワノメイガは雄穂抽出時、雌穂（絹糸）抽出時を含め2回以上防除を行ってください。

いちご

1. 親株の管理

- ① 弱いランナーは早期に除去し充実した太いランナーを誘引する。
- ② ランナーは密植とならないよう誘引する。  
※親株の古葉やわき芽の整理をし、風通しを良くする。ランナーの側枝は除去する。
- ③ 肥切れしないよう適時追肥をする。（1B化成 6粒/株を2~3週間間隔）



2. 病害虫防除 育苗炭そ病防除ローテーション（例）

	薬剤名	倍率	回数	混用薬剤 例
5月5週目	ベルコート（水）	1,000倍	5	㊟ピラニカ（EW）
6月1週目	ファンタジスタ（顆水）	2,000倍	3	㊟モスピラン（水）
6月2週目	ジーファイン（水）	1,000倍	-	エコピタ（液）
6月3週目	ゲッター（水）	1,000倍	3	モベント（フ）
6月4週目	オーソサイド（水）	800倍	3	プレバソン（フ）

※発生病害虫を観察し、必要に応じ農薬を選択してください。

熱中症にご注意ください！

暑い中の作業、お疲れ様です。『よし、あともう少し！』と頑張っていたく前に、  
こまめに水分補給をしてください。JAの飲料もご利用くださいm(\_)\_m

★オススメは静岡の温州ミカンで作られたおいしいみかんジュース★

「みかん日和」果汁70%（みかん3個分）190g×30缶 1,987円（税込）