

長田営農経済センターだより No.251

発行：平成30年6月20日 電話：259-3233 Fax：259-3164



センター長	茶・有害鳥獣・青壮年部	苺・水稻・蔬菜	果 樹	女性 部
高橋	熊ヶ谷	山森・杉山	鈴木	小林
購 買				
畑沢・山本・糟屋・岡部・山田・内野				

水 稻 (担当：山森・杉山)

- ガス抜き
水田に入って、足跡から泡（ガス）が出てきたら、一度落水しガスを抜く
- 中干し
田植えから30～35日後、1株18～20本の「分けつ」を確保したら、地面がヒビ割れする程度に中干しする
- 病害虫防除（下記薬剤は混用可、7月下旬を目安に散布する）

摘要	液剤の場合	使用基準	早生	中・晩生
ウンカ等	トレボン乳剤	1000～2000倍-14日-3回	○	○
紋枯病	モンカットフロアブル	1000～1500倍-14日-3回	○	○
いもち病	ダブルカットフロアブル	1000倍-穂揃期-2回	○	

※ 早生品種は3種混用、中・晩生品種はモンカットFL・トレボン乳剤の2種混用で散布する

(4) 体系処理の場合の後期除草剤

雑草の種類	除草剤	薬量(10a当)	処理時期	備 考
ヒエ専用	クリンチャーEW	100ml/25～100ℓ	田植後20日～30日前	ノビエ6葉期まで
広葉雑草	MCPソーダ塩	200g/70～100ℓ	有効分けつ終止期、収穫60日前	落水散布
ワダカ・カグワなど	アトトリ1キロ粒剤	1kg	田植後20日～収穫45日前	水がある状態で使用

いちご (担当：山森・杉山) 本圃に病害虫を持ち込まないように、徹底的に防除する！

- ・タンソ病を発生させないために、葉かきの作業後には薬剤散布し、雨の日は作業を避ける
- ・ハウス内が高温にならないよう、寒冷紗をして温度を下げる
- ・親株の肥料が切れないように、1B化成の追肥を2週間間隔で4～6粒施用する



病害虫	薬剤名	使用倍数	回数	備考
炭そ病	ベルコート水和剤	4000倍	5回	①ローテーション散布 を心がける ②高温時の薬剤散布を避ける ③展着剤はアビオンEが オススメ
	セイビアフロアブル20	1500倍	3回	
うどんこ病	ジーファイン水和剤	1000倍	—	
	アフエットフロアブル	2000倍	3回	
コナジラミ・アブラムシ	コルト顆粒水和剤	3000倍	3回	
スリップス・ヨトウ	マッチ乳剤	2000倍	4回	
ハダニ・アブラムシ	エコピタ液剤	100倍	—	

未成熟とうもろこし (スイートコーン)

雄穂の出穂時期から特に害虫の発生が多くなるので注意

雄穂が出穂する頃にデナポン粒剤5、雌穂が出穂する頃にプレバソンフロアブル5の使用がオススメ

病 害 虫	薬 剤 名	使 用 倍 数	使 用 基 準
アワノメイガ	デナポン粒剤5	4～6kg/10a	21日-2回
	プレバソンフロアブル5	2000倍	前日-3回
アブラムシ	モスピラン顆粒水溶剤【印】	2000倍	前日-3回

落葉果樹 (担当：鈴木)

作物	使用時期	病 害 虫	薬 剤 名	使用倍数	使用基準
桃	7月 上中旬 収穫後	カイガラムシ類	アプロード水和剤	1000倍	21日-3回
		シンクイムシ類 (発生園) 展着剤	ダントツ水溶剤 ブレイクスルー	2000倍 10000倍	7日-3回 —
※収穫後の施肥管理 7月上中旬 桃夏ペレット 10aあたり6袋 (樹勢維持のため収穫後早めに施用)					
梨	7月 上旬 混用可	輪紋病・黒斑病 ハマキムシ、シンクイムシ	ベンレート水和剤 フェニックスフロアブル	3000倍 4000倍	前日-4回 前日-2回
	7月 中旬 混用可	輪紋病・黒斑病 ハマキムシ、シンクイムシ	ストロビードライフロアブル テルスター水和剤	2000倍 1000倍	前日-3回 前日-2回
	7月 下旬	シンクイムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回
キウイ	7月 上中旬 混用可	果実軟腐病 カイガラムシ カメムシ	ロブラール水和剤 アプロード水和剤 アドマイヤーフロアブル【印】	1000倍 1000倍 2000倍	前日-4回 前日-2回 前日-2回
		※夏季剪定 ⇒ 摘心・間引きにより棚下の明るさを確保、誘引により翌年の優良な結果母枝を確保			
イチジク	7月 上旬	さび病 黒かび病 アザミウマ類	トリフミン水和剤 トップジンM水和剤 モスピラン顆粒水溶剤【印】	2000倍 1000倍 2000倍	7日前-3回 7日前-5回 前日-3回
	7月 下旬	黒かび病	ロブラール500アクア	1000倍	3日前-3回
柿	7月 上旬	落葉病・炭疽病 カメムシ	ペンコゼブ水和剤 スタークル顆粒水溶剤	500倍 2000倍	45日前-2回 前日-3回
	7月 中旬	カキノヘタムシガ	フェニックス顆粒水和剤	4000倍	7日前-2回
※夏肥の施用 7月中旬 新FTE S280 10aあたり3袋					

柑 橘 (担当：鈴木)

品 種	時 期	病 害 虫	薬 剤 名	倍 数	使用基準
温州みかん	7月上中旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60日-2回
		チャノアザミウマ	キラップフロアブル	2000倍	21日-2回
		カイガラムシ類	アプロードエースフロアブル	1000倍	14日-2回
中晩柑 (スガエガント ・不知火 等)	7月 上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍	—
	7月 中旬	黒点病 チャノアザミウマ	エムダイファー水和剤 キラップフロアブル	600倍 2000倍	90日-4回 21日-2回

※エムダイファー(水) ⇒ 使用基準；収穫前60日のため、極早生(特に日南)はペンコゼブ(30日)を散布。

*夏肥の施用

7月中旬	スルガエレガント	スルガペレット	3袋 /10a
	ポンカン	新FTE S604	2袋 /10a

*早期摘果

着果量が多い樹は、樹勢の維持と来年度の収量確保のため、早期摘果を実施しましょう！ 来年の結果母枝を確保するために、7月上中旬に樹冠上部1/3全摘果や枝別全摘果により夏芽の発生を促しましょう。中晩柑も大玉生産のために、早期摘果を実施しましょう。

茶 (担当 : 熊ヶ谷)

時期	病虫害	薬剤名	使用倍数	使用方法	摘採迄の日数
二番茶整枝後	ハマキムシ類	サムコルフロアブル10	2000倍	単用	3日
三番茶萌芽期~ 1葉開葉期	炭そ病・もち病 新梢枯死症 ウンカ・スリップス	フロンサイドSC コルト顆粒水和剤	2000倍 2000倍	混用	14日
三番茶生育期	炭そ病・もち病 褐色円星病 ウンカ・スリップス ハマキムシ類	インダーフロアブル ディアナSC	5000倍 5000倍	混用	7日

輪斑病がある茶園は アミスター20フロアブル 2000倍を二番茶整枝直後に散布してください
(摘採前日数 14日)

時期	病虫害	薬剤名	使用倍数	使用方法	摘採迄の日数
7月中~下旬	クワシロカイガラムシ	※コルト顆粒水和剤	2000倍	単用	7日
		スプラサイド乳剤【印】	1500倍	単用	14日
		※アプロードエースフロアブル	1000倍	単用	14日

※ の印のある薬剤は、チャトゲコナジラミと同時防除できます


土壤検定の実施 ~畑の健康診断~

茶を対象に土壌分析を実施!

診断希望の方は最寄の支店へ土壌を提出して下さい

- 1) 提出期限 7月6日(金)
- 2) 試料 1箇所の畑につき、中心と四隅から土を採る
また、15cm掘り下げた部分の土を採る
- 3) 提出 土壌は必ず乾燥させ、200g程度をビニール袋に入れる
(土塊や石が混入しないよう、「ふるい」にかける)
- 4) 診断結果 7月下旬に発信予定

※ 氏名・電話番号・住所・作物・圃場を必ず記載して下さい



すんぷほんやま

『駿府本山秋のお茶まつり』参加者募集!!

- ★ 主催 駿府本山お茶まつり委員会
- ★ 内容 紅葉山庭園茶室にて、生産者自らが自慢の「本山茶」を消費者に対し呈茶していただきます。
そのお茶の販売も2日間致します。(出店料は無料)
販売用のお茶は、1個500円で、50個(要相談)ご用意してください。
- ★ 開催日 平成30年11月3日(土) 11月4日(日) (参加はいずれか1日)
- ★ 会場 駿府城公園内紅葉山庭園茶室「雲海」ほかお外席
- ★ 申込書は、長田営農センター窓口にあります。FAXでの送付もいたします。
- ★ 申込み締め切り **8月24日(金)**
- ★ 申込み・お問合せは、日本茶(1)トラクター協会静岡市支部
電話054-653-3103 FAX054-653-3203

お知らせ

JA静岡市「ふれあい夏っ得フェア2018」

おなじみの購買提携業者がお得な生活用品を集めました! 限定販売もあります!

日時 平成30年7月21日(土) 午前9時~午後6時

7月22日(日) 午前9時~午後5時

会場 JA静岡市本店 (1階ロビー・3階・4階)

お楽しみ抽選会
空クジなし!

☆ 衣料品
健康器具 ☆

宝石・日光陶器
新茶詰め放題
その他食品・生活用品

※ 詳しくは別紙のチラシをご覧ください

多数の方々のご来場お待ちしております!

JA農業機械大展示会

日時:平成30年7月6日(金)~8日(日) 9時~16時 (8日は12時まで)

会場:榛原郡吉田町川尻「吉田公園」 ※ 詳しくは別紙のチラシをご覧ください

青色専従者給与源泉所得税申告事務説明会について

会場月日 長田支店 平成30年7月2日(月)

下川原支店 平成30年7月3日(火)

丸子支店 平成30年7月4日(水)

時間 午前の部 10:00~11:00 午後の部 13:00~14:00

持ち物 平成30年度源泉徴収簿・納付キップ・通帳(事業主)・通帳印

※金融窓口は午後3:00までとなりますのでご注意ください!

長田有害対策協議会 伝言板

〔有害鳥獣駆除実施について〕

駆除期間 平成30年6月1日~7月31日まで

駆除範囲 長田・丸子一円 駆除対象 イノシシ・ハクビシン・アナグマ・ニホンジカ・サル
・アライグマ・タヌキ・カラス・ヒヨドリ・ドバト

※駆除実施期間中のおねがい 期間中に山へ入る場合は、十分注意して下さい!



農薬危害防止運動実施中

農薬の安全使用基準を遵守し、事故の無いよう保管を徹底して下さい。