

東部営農経済センター一便り 6月号

JA静岡市東部営農経済センター TEL: 245-7527

センター長	女性部	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	購買
海野	大越	深井	山梨	榮	田山・松風・望月・瀧田・森川

ふれあい
夏の得フェア開催
～お買い得夏物バーゲン～

平成30年
7月21日(土) 9:00~18:00
7月22日(日) 9:00~17:00

会場: JA静岡市 本店

たのしいイベントもたくさん!

抽選会・金魚すくい・ヨーヨー
懐かしの駄菓子 などなど...

**購買店専用の
電話番号を設けました!**

☎ 054-245-7555

購買店に御用の方は、上記の電話番号にお電話ください。



茶 【防除】

時期	病害虫名	薬剤名	倍数	日数	使用方法
2番茶整枝後	ハマキムシ類	サムコルフロアブル	2,000倍	3日	単
輪斑病の発生が予想される場合		アミスター2070アブル	2,000倍	14日	単
若齢幼虫期 (3番茶萌芽期)	チャノトゲ コナジラミ	ディアナSC	5,000倍	7日	単
		ダントツ水溶剤	2,000倍	7日	単
		コルト顆粒水和剤	3,000倍	7日	単
		ハチハチ乳剤(劇)	1,000倍	14日	単
		アブロードエースフロアブル	1,000倍	21日	単
		コテツフロアブル(劇)	2,000倍	7日	単
☆チャトゲコナジラミの2回目発生 幼虫(卵~4齢幼虫)の防除適期(発生ピーク)は、7月下旬から8月上旬とされます。					
3番茶萌芽期	炭そ病・もち病 新梢枯死症	フロンサイドSC	2,000倍	14日	混
	ウンカ・スリップス	コルト顆粒水和剤	2,000倍		
7月上・中旬頃	クワシロ カイガラムシ	アブロードエースフロアブル	1,000倍	21日	単
		スプラサイド乳剤(劇)	1,500倍	14日	単
		コルト顆粒水和剤	2,000倍	7日	単

【施肥】(母枝肥)

- 3茶(母枝)は来年の1茶の土台となるため大変重要です。
翌年の生葉収量、品質向上の為に必ず施肥して下さい
- 時期...2番茶摘採後 施肥量...化成肥料 3袋/10a当り

柑 橘

【状況】 今年のみかんは着花量が多い状況です。今後の生理落果次第では生産量が大きく変わってきます。また、これからは梅雨時期で防除が天気との勝負になります。暑い時期にもなりますので、熱中症に注意し農作業を行って下さい。

① 防除

【温州みかん】

時期	対象病害虫名	使用農薬名	希釈倍数
7月中旬	チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	2,000倍
	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍
	カイガラムシ類	アブロードエースフロアブル	1,000倍

【中晩柑】(スルガ・デコボン・はるみ・ポンカン)

時期	対象病害虫名	使用農薬名	希釈倍数
7月上旬	かいよう病	ICボルドー412	50倍
7月中旬	チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	2,000倍
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍

② 品質向上対策...フィガロン乳剤の散布 (中晩柑には使用しない事)

第1回目	満開後70日	2,000倍
第2回目	満開後90日	3,000倍

※1回目と2回目の散布間隔は20日程度とし、あまり間隔が空かないよう注意して下さい。

③ 摘果

極早生・早生 摘果を7月末までに実施して下さい。
中晩柑 樹勢維持のため樹冠上部三分の一摘果は早期に行う。
スルガエレガント・デコボン・ポンカンは、大玉生産のため7月中旬に90%以上摘果が終了し、以降仕上げ摘果として下さい。

③ マルチの実施...被覆時期: 早生...7月上旬 青島...8月上旬

落葉果樹 ※落葉果樹の農薬は特殊なものが多いため、事前にお問い合わせください

作物名	時期	対象病害虫	使用農薬名	希釈倍数
柿	7月上旬	落葉病・炭そ病	エムダイファー水和剤	500倍
		カメムシ類	テルスター水和剤	1,000倍
	7月中旬	カキノハタムシガ・ハマキムシ類	フェニックスフロアブル	4,000倍
		カメムシ類	キラップフロアブル	2,000倍
梨	7月上旬	輪紋病	ベンレート水和剤	3,000倍
		ハマキ・シンクイムシ類	フェニックスフロアブル	4,000倍
	7月中旬	ハマキ・シンクイ・カメムシ	テルスター水和剤	1,000倍
		輪紋病・黒星病	ストロビードライフフロアブル	2,000倍
7月下旬	シンクイムシ類・カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	
いちじく	7月上旬	アザミウマ・キボシカミキリ	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	2,000倍
		さび病	トリフミン水和剤	2,000倍
	7月中旬	黒かび病	トップジンM水和剤	1,000倍
		カンザワハダニ	マイトコーネフロアブル	1,000倍
7月下旬	黒かび病	ロブルール500アクア	1,000倍	

水稻

1. ガス抜き

特に前年の稲藁、雑草を多くすきこんだ場合や、荒起こしが遅かった場合に行う。
⇒ 1~2日間程度。(活着期)

2. 中干し

- (1) 田植 30~35日後を目安に、1株 18~20本の分けつを確保したら中干しを開始する
- (2) 中干しは表面がヒビ割れする程度(7~10日間)とし、肥沃田や排水不良田は強め、やせ地は弱めとする
- (3) 特に元肥一発肥料を施用した田では、中干し時期を厳守する

3. 倒伏軽減や食味の向上を図りたい場合、『ファイト・アップ』や『マリンハート』を使用。

ファイトアップの使用時期 出穂 45~30日前 10a施用量 1袋(10錠)
(6/1 田植の場合) コシヒカリ 6/23~7/8頃 きぬむすめ 7/4~7/19頃

4. 除草剤

中干し時に下記のいずれかを散布する(後期剤) 10aあたり

ヒエ・広葉	クリンチャーバス ME ※1	1,000ml/10a	展着剤不用	混用可
ヒエ専用	クリンチャーEW ※2	100ml/10a		
広葉雑草	MCPソーダ塩 ※3	200g/10a	分けつ抑制	
ヒエ以外	アトトリ1キロ粒剤	1kg/10a	オモダカ、クログワイなど	

- ※ どの薬剤も雑草が大きくなってからは効果が劣る。雑草5葉期までに散布を行う。
- ※ 1、雑草を十分露出させ、雑草の茎葉にかかるように散布。
- ※ 2、深水条件下では効果が劣るので落水または浅水条件で散布する。
- ※ 3、MCPソーダとグラスシンMEはどちらか1回の使用。

5. 中干し後の水管理

- (1) 中干し後、3日~数日おきに間断かん水とする
- (2) 穂ばらみ期~出穂期は、水を最も必要とするのでたん水する
- (3) 出穂後は、間断かん水に戻す

稲こうじ病にご注意ください!

近年、増えている病気です。

- 1、発生条件：窒素過多で生育が遅延した場合
- 2、防除適期：出穂 10日前ころ
- 3、登録薬剤：ブラシンフロアブル

やさい

登録作物	対称病害虫	薬剤名	倍率	日数	回数
トマト ミニトマト きゅうり なす	アブラムシ アザミウマ	スタークル(顆水) ※	2,000倍	前日	2回
	ホコリダニ サビダニ	コロマイト(乳)	1,500倍	前日	2回
	うどんこ病 灰色かび病	アフエット(フ)	2,000倍	前日	3回
	オオタバコガ ヨトウムシ	フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	前日	2回△
		アフアーム乳剤	2000倍	前日	2回○


※・・・トマト、ミニトマトはコナジラミのみ登録有

△・・・なす、きゅうりは3回 ○・・・トマト、ミニトマトは5回

いちご

1. 本圃準備(次年度に向けて)

- ① 除塩
土耕…ビニールを外し、雨にあてる。水田転作地ではたん水状態にする。
高設…液肥を切り、水のみ流し、イチゴに養分をすわせた後に株を処分する。
- ② 土壤消毒
土耕…バスアミド微粒剤(丸) 20~30kg/10a
高設…たっぷり灌水し、ビニールをかけ、太陽熱消毒を行う。
- ③ 土壤改良
土耕…物理的改善にペラボン(ヤシ柄) 90袋/10a(3年に1回)
高設…長年使用している培土は腐食が進み、排水性が悪くなってきます。
10年近い培土は入れ替えを行いましょ。 ※高設でペラボンを使用する場合は「あく抜き」を使用してください。



2. 親株管理・採苗

- ① 1週間~10日に1回を目安にIB化成S1号を4~6粒/株施用。
- ② 風通が悪くならないよう、古葉、わき芽を摘除する。

親株が肥切しないように、こまめに追肥を行いましょ。

3. 炭そ病防除ローテーション(先月号の続き)

時期	薬剤	倍率	備考	回数	混用薬剤例
7月1週目	ジマンダイセン(水)	600倍		6回	コテツ(フ)
7月2週目	ファンタジスタ(顆水)	2,000倍		3回	モスピラン(水溶)
7月3週目	アントラコール(顆水)	500倍		6回	エコピタ(液)
7月4週目	サンリット(水)	2,000倍	うどんこ病	3回	モレスタン(水)
8月1週目	アミスター20(フ)	1,500倍	うどんこ病	4回	パロック(フ)

☆土壌分析実施のお知らせ(茶・柑橘・野菜類)☆

- 1、調査圃場の5か所から土壌採取し乾燥。(畑の四隅と真ん中付近、深さ30cm位の土壌)
- 2、乾した(風乾燥)土を粉碎し、1mm目のフルイでふるって下さい。(必要量200g位)
- 3、提出の際は、袋に、住所・氏名・電話番号・作物名を必ずご記入下さい
- 4、7月6日(金)までに最寄りの支店または営農センターまでお持ちください。(期日厳守)

JA農業機械展示会

詳しい内容は、最寄りのJA購買店にご確認下さい。

開催期間
7月6日(金)・7日(土)・8日(日)

時間
AM9時~PM4時(最終日昼12時)

会場
吉田公園特設会場(榛原郡吉田町川尻)



暑い夏にぴったり!!

ジュースや茶のボトル缶も

大好評販売中♪

