

南の風だより 2月号

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155



センター長	杉山	購 買	後藤・中村・谷米	女 性 部	横山
TAC	小澤	水稲・野菜・苺	川島・大村	茶・柑橘	平野
購買地区担当	海野(東豊田・豊田) ・ 栗田(久能・大谷) ・ 鷲巣(高松・大里)			配送員	末永・立花

水稲



ケイ酸には倒伏防止・食味向上の効果があります！
また、ケイ酸は水稲にとって最も多く必要な養分です！

1. ケイ酸資材の施用

珪力燐	6~8袋	ケイカル・リン酸の補給
オイスターミネラル	5袋	カキ殻によりケイ酸の吸収率UP、
けい酸加里プレミアム	2~3袋	ケイ酸、カリの他、苦土、ホウ素、石灰、鉄を含む
とれ太郎	3袋	省力型肥料で、リン酸、苦土、ケイ酸、石灰を含む

2. その他土づくり資材の施用

ようりん	40~80kg/10a	土壌の有効リン酸を高める
ワラ分解キング	10kg/10a	稲藁の分解を促進する
アツミン	20~40kg/10a	リン酸などの肥効を高める

いちじく

- 敷藁 3~4月にかけて実施する。(雨による病原菌の跳ね返りを防ぎます)
- 病害虫防除

3月	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7~10倍	発芽前
----	-------	--------	-------	-----

※石灰硫黄合剤は、残臭が強いので、近隣に住宅等がある場合はご注意ください。
また強アルカリの薬液ですのでご使用にはご注意ください。

柑橘

1. 春肥の施用(早生温州・青島温州)

3月中旬	みかん80パレット	早生温州5袋、青島6袋/10a	施用後中耕する
------	-----------	-----------------	---------

2. 病害虫防除(スルガエレガント・中晩柑)

3月下旬 発芽直前	かいよう病	ICボルドー -66D	60倍	マシン油乳剤との散布は前後14日間以上あけること。 発芽期以降、散布しない。(落葉)
--------------	-------	----------------	-----	---



茶

- 病害虫防除 ※今年は暖冬のため、ダニの発生が早まる恐れがあります。ご注意ください。

3月上中旬(萌芽前)	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	14日
------------	---------	-----------	--------	-----

2. 施肥

2月中~下旬	春肥1回目	農協茶配合肥料	5袋/10a
3月上~中旬	春肥2回目	農協茶配合肥料	5袋/10a

JA静岡市グリーンティーフォーラム2020

日時 令和2年3月26日(木) 13:30~16:30
場所 グランシップ11階 会議ホール「風」
内容 ①各種表彰 ②事例発表



2020年 月刊「茶誌」「柑橘誌」新規申込みについて

- 茶誌 6,960円(税込) 購読期間: 2020.4月号 ~ 2021.3月号
- 柑橘誌 6,600円(税込) 購読期間: 2020.5月号 ~ 2021.4月号

購読希望者は、3月9日(月)までに南部営農経済センターへご連絡ください。(237-5580)

やさい



気温の上昇とともに病害虫の発生も多くなります。
早期防除、病気は予防散布を心がけましょう！

1. タマネギ

- 病原細菌は雨風によって葉に損傷を生じると感染・拡大する事が多いので気象情報に注意して、予防散布又は、雨風がおさまったら薬剤散布を行い防除する。
- 追肥は2月下旬~3月中旬までに行う。4月以降は腐敗を増加させる可能性があるので注意！

腐敗病・軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日~5回
灰色腐敗病・灰色カビ病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日~4回
アザミウマ類	アディオン乳剤	3,000倍	7日~5回

2. さやえんどう(スナック・きぬさや)

うどんこ病	トリフミン水和剤	5,000倍	前日~5回
ハダカアザミ類・アブラムシ類	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	前日~2回

3. 未成熟そらまめ

マメハモグリバエ	カスケード乳剤	2,000倍	前日~3回
ハダカアザミ類・アブラムシ類	アディオン乳剤	3,000倍	7日~3回

4. ほうれんそう

ベと病	ランマンフロアブル	2,000倍	3日-3回
アブラムシ類	ウララDF	4,000倍	前日-2回

春夏野菜の植付にあたり、連作障害の発生を抑えるため下記の事に注意しましょう！

○連作障害回避期間のめやす

年	野菜の種類
1年休閑	ほうれんそう、コカブ、いんげんまめ
2年休閑	レタス、はくさい、きゅうり、ニラ、パセリ
3~4年休閑	なす、トマト、ピーマン、さといも、ブロッコリー、ソラマメ
4~5年休閑	エンドウマメ、スイカ、メロン、しょうが
発生しにくい	かぼちゃ、ズッキーニ、たまねぎ、ねぎ、にんじん

○同じ仲間の野菜を連作しない

ナス科	なす、トマト、ピーマン、ししとう、じゃがいも
ウリ科	きゅうり、かぼちゃ、ズッキーニ、スイカ、メロン

いちご 【今年は暖冬の為、害虫が多発しています。初期防除の徹底を】

1.栽培管理

- 収穫終了後の果房、古葉は早めに除去する。古葉除去後に農薬散布を行う
- 1果房3果を目安に摘果する。(草勢をみて調整する。)
- 3月に入ると日射量が増え、渇水量が不足することがあるので注意する。
※特に高設栽培では廃液量のチェックを行う。(廃液率30%程度)



2.病害虫防除

- (1) 灰色かび病・うどんこ病

病害	薬剤	使用基準		備考
灰色かび病	フルピカフロアブル	3,000倍	前日-3回	うどんこにも効果
	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	前日-3回	
うどんこ病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日-2回	ガッテン+フルピカの混合剤
	カリグリーン	1,000倍	前日-なし	高温で薬害注意
	アフェットフロアブル	2,000倍	前日-3回	灰カビにも効果

- (2) アザミウマ・アブラムシ・ハダニ



アザミウマは、ハウス内で越冬したものが急激に増殖し始めています。果実の被害が出てからでは手遅れです。発生初期の防除を徹底して行いましょう！

※ 農薬の毒劇物の表記について：農薬名の横に☞や劇で表記してあります。購入の際は、印鑑が必要になります。(普通物は、特に表記してありません。)

薬剤	使用基準		アザミウマ	アブラムシ	ハダニ	入蜂	天敵
			アザミ	ウマ	シ		
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日-2回	○			3日	△
ディアナSC	2,500倍	前日-2回	○			3日	△
マッチ乳剤	2,000倍	前日-4回	○			1日	◎
ウララDF	4,000倍	前日-2回		○		1日	◎
チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日-3回		○		1日	◎
カネマイトフロアブル	1,500倍	前日-1回	新葉薬害注意		○	1日	◎
エコピタ液剤	100倍	前日-なし		○	○	1日	○



JA静岡市 いちご果実品評会

令和2年1月24日開催
南部支部抜粋

3等 増田 安昭様 (紅ほっぺ)

JA静岡市

静岡市長賞

いちご園地共進会

令和1年12月24日・令和2年1月30日開催
南部支部抜粋

優等 小澤 保彦様

2等 内野 武久様

ご入賞おめでとうございます

農薬使用上の注意

・栽培する作物に登録のある農薬を使用する(登録外の農薬は使用できません)

大分類	中分類	登録作物名	品種等
野菜類	豆類(未成熟)	えだまめ	
		さやいんげん	モロッコ・ヒラサヤインゲン
		さやえんどう	きぬさやえんどう・砂糖えんどう スナックエンドウ
		実えんどう	グリーンピース・うすいえんどう
	豆類(種実)	いんげんまめ	いんげん・うずらまめ
		大豆	

スナックエンドウは「さやえんどう」「豆類(未成熟)または野菜類」に登録がある剤が使用可
・使用方法を守る(倍率・散布後収穫までの日数・使用回数)

【有度山イノシシ駆除実施のお知らせ】

猟銃による駆除を下記のとおり行います。駆除当日は入山を極力控えて下さい。

(1) 実施地区 久能山・有度山一体(古宿・安居・根古屋)

(2) 実施日程 3月20日(金・祝), 3月29日(土), 4月4日(土)

