

センター長	茶	野菜・水稲・苺	果樹・有害鳥獣	女性部	購 買
伊藤	佐藤・武田	松尾	原田	漆畑	橋本・萩原 正込
配送	加藤・長谷川	大河内地区担当	滝浪	梅ヶ島地区担当	望月

《 茶 》 1番茶に向けて大事な管理のスタートです。



1番茶前の大事な管理が始まります。生葉品質は日々の栽培管理に左右され、結果として茶価の相場にも影響します。その為にも、1番茶前の肥培管理などの徹底をお願い致します。茶園の状態については、昨年よりも休眠時期が短いと予測され、3月からの芽の動きが活発になると思いますので、1番茶の摘採開始時期を逆算し計画的に作業を行って下さい。

〔春 肥〕

2 回 目 3月上旬 静岡茶配合（有機質肥料） 5～7袋／10a
 （山間地）3月下旬 静岡茶配合（有機質肥料） 5～7袋／10a

〔春整枝〕 寒さが厳しい所・干ばつの影響が大きい茶園では十分注意する事！！

時 期 2月下旬から3月中旬にかけて、寒害をうける恐れがなくなった頃。
 （山間地）3月中下旬
 深 さ 昨年の二番茶摘採面から4～5cm（三番茶葉2～3枚残す）の位置。

〔再整枝（化粧ならし） 芽に掛からないように注意しましょう！！

時 期 2月中旬から寒害をうける恐れがなくなった頃。
 深 さ 秋整枝面より深くならないよう注意し、摘採面を揃える程度にごく浅く、芽が動いた後の立葉の除去は手バサミで丁寧に行ってください。

〔病害虫防除〕

赤 焼 病 2月下旬 ドイツボルドーA 500倍 14日 単用

◎カンザワハダニ 3月中旬～下旬 バロックフロアブル 2,000倍 14日 単用

※バロックフロアブルは殺卵・殺幼虫効果主体であり、成虫には効果がないがその成虫が産んだ卵はふ化しない。

※ オマイト乳剤1,500倍14日単用を散布の時は新芽に対して薬害があるので注意する。

◆ 購買よりお知らせ ◆

味くらべ便 ご注文受付中！！ 詳しくは店頭またはお電話で。

12ヶ月の年間予約として募集します。中途加入も歓迎。1年中受け付けています。
JAがお届けするお米の味めぐり。日本各地の美味しいお米。

〔防霜ファンの点検〕

防霜ファンの運転開始は通常の場合、萌芽期の2週間前（3月上中旬）から開始する。

◆断線の有無 ファンの回転は正常かどうか？

ファンは三相電源で1本切れていても回転するが、断線していると回転や首振り運動が不安定になる。

◆サーモスタット 設定温度で始動するかどうか？

氷水の中にサーモスタットを入れて作動するか確認する。またサーモスタットの設定位置は防霜ファンの影響を受けない、茶園の最も低温になりやすい位置の茶株面に設置します。その際、茶株内部に感知部が入らないように注意する。設定温度は通常3℃とする。

◆効果範囲の点検 柱の傾き、ファンの首振り状態

お知らせ

◎ 防霜ファンで不明な点ありましたら、茶担当まで（佐藤・武田）

【JA静岡市グリーンティーフォーラム2019】

日 時 令和2年 3月 26日（木） 午後 1時30分 開会（受付 午後1時～）
 会 場 グランシップ 会議ホール 風（11階）
 内 容 基調講演 未定

功労者、各茶審査会優秀者表彰、情勢報告、茶業振興方針、福引き

盛りだくさんな内容となっていますので、茶生産者皆様、ぜひ会場へ足をお運び下さい。

《茶生産履歴システムについて》

JA 静岡市茶生産履歴システムにご登録されている組合員の方へ（防除・施肥・製造記録）

☆1番茶前提出について


1番茶前の施肥・防除管理が済み次第、最寄りの支店までご提出をお願いします。

- ※ 独自システムを導入されている共同工場につきましては従来通りの対応をお願いします。
- ※ 履歴を提出されない方については、共販出荷できませんので必ず提出をお願いします。

何かご不明な点ありましたら、しづはた営農経済センター（294-9330）茶担当（佐藤・武田）まで

《いちご》

灰色カビ・うどんこ病の防除



これから気温が上がり始めると、湿度とともにカビが出始めます。

既に一部出始めたところもあるので、注意して防除してください。

どうしても出てしまった場合は、**スミレックスくん煙剤**を使用してください。

うどんこ	灰カビ	薬剤名	倍率	使用基準	天敵	備考
○	500倍	サンヨール	1,000倍	前日-6回	◎	薬害
○	○	フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	前日-3回	-	
○		ストロビーフロアブル	3,000~5,000倍	前日-3回	-	浸透性展着剤 ×
治	800倍	カリグリーン	800~1,000倍	前日	◎	薬害
治		ジーファイン水和剤	1,000倍	前日	◎	混用
○		サンクリスタル乳剤	500倍	前日	○	推奨
治		パンチョ TF 顆粒水和剤	2,000倍	前日-2回	-	EBI 剤

ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシ類の防除

① 芽欠きや下葉の処理を怠ると、害虫の蔓延を招きやすいです。

被害がひどい場合(クモの巣が張ってしまった等)は、その葉をかいてから薬剤の散布をしてください。

天敵がいても、蜘蛛の巣が見える場合は、薬剤での防除をお願いします。

※迷った時は、**営農センター 松尾**までご連絡ください。(054-294-9330)



② いつも発生しやすい場所を観察し、早期発見に努めましょう。

(循環扇の風の当たる場所や、入り口付近など、乾燥しやすい場所に発生しやすいです。)

ハダニが発生してしまった圃場は、成虫に効く薬剤だけではなく、必ず卵にも効く薬剤と混用で散布してください。天敵を導入する予定の方は、影響日数に気をつけて散布してください。

例) スターマイト(単用) → エコピタ(200倍 幼虫、成虫) + ニッソラン(卵)

※ダニサラバ、スターマイトは同系統の薬剤のため、連用すると効果がない場合があります。

アザミウマ類は、ハチへの影響が考えられますので、マッチ乳剤等を予防的に散布してください。

対象害虫	薬剤名	倍率	使用基準	入蜂	天敵	備考
ハダニ	コロマイト水和剤	2,000倍	前日-2回	-	14日	
	バロックフロアブル	2,000倍	前日-1回	1日	14日	卵のみ
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日-2回	1日	1日	成虫・幼虫
	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日-2回	1日	1日	全ステージ
アザミウマ類	マッチ乳剤	2,000倍	前日-4回	1日	1日	
	スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日-2回	3日	1日	成分が同じため
	ディアナSC	5,000倍	前日-3回	3日	-	連用を避ける
アブラムシ	劇モスピラン水溶剤	3,000倍	前日-2回	1日	1日	コナジラミ、アザミウマ類
	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日-3回	1日	1日	コナジラミ
	ウララDF	3,000倍	前日-2回	1日	1日	

ボタニガードES(生物農薬につき、注文後生産)

アザミウマ類 コナジラミ類	ボタニガードES	1,000倍	発生初期 使用回数制限なし	ハチ、天敵に 影響なし
------------------	----------	--------	------------------	----------------

ボタニガードはカビの仲間です。殺菌剤や下記以外の薬剤との混用は注意が必要です。

混用可能薬剤	倍率	備考
マッチ乳剤	2,000倍	ハチ-1日・天敵-○
劇モスピラン水溶剤	2,000倍	ハチ-1日・天敵-×
チェス顆粒水和剤	5,000倍	ハチ-1日・天敵-○
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	ハチ-3日・天敵-1日

《水稻》

1. 圃場管理

モグラ、ねずみの穴を塞ぎ、アゼの整備をして水もちを良くする。



2. 珪酸資材の投入

下記のいずれかを投入する。(袋数は10aあたりの投入量)

珪力燐 6~8袋 混合りん肥 珪カル・リン酸の補給

農カアップ 5袋 けい酸質肥料、鉄、マンガン、苦土、リン酸を含む

PKグツツ 5袋 主要6成分(リン酸・ケイ酸・石灰・苦土・鉄・マンガン)をバランスよく含む

とれ太郎 3袋 省力型土作り肥料。リン酸・苦土・ケイ酸・石灰を含む

《アスパラガス》

ハウスのアスパラガスは既に出始めた場所もあります。

アスパラ栽培に大切なのは地力です！堆肥を多めに投入し、疲れた地面を復活させましょう。

春どり収穫中でも、少しずつ肥料を吸うことがわかっていますので、10aにつき10kg程度の緩効性の肥料を取れはじめ頃から施用すると、後半のスタミナ切れに効果的です。

＜水分＞

芽が出始めたら、水分を十分に与えてから保温(蒸し込み)を開始します。保温開始時に土が乾燥していると、春芽収穫までに時間がかかり、収穫期間中の灌水量も多くなるため、地温が下がりやすくなります。なので、あらかじめ十分に灌水を行ったあと、保温するようにしましょう。

水温で株が冷えてしまう場合がありますので、灌水は、しっかり日が当たってから行うようにします。また、夕方の灌水は避けましょう。

《やさい》

作物	対象病害	薬剤	倍率	使用基準
玉葱	灰色腐敗病	スミレックス水和剤	1000倍	前日-5回
	ネギアザミウマ	劇モスピラン水溶剤	2000倍	7日-3回
ほうれん草	アブラムシ	劇アドマイヤーフロアブル	4000倍	前日-2回
	べと病	アリエッティ水和剤	1500倍	前日-2回

《柑橘》

2月に入り中晩柑の出荷が本格化してきました。今年は1月の寒波の襲来で「スルガエレガント」、「不知火」はコハン症などの果皮障害の発生が心配されますので選果の徹底をお願いします。

● 防除管理

この時期の病害虫防除は今後の発生に影響してくるので必ず行うこと

作物名	散布時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
温州みかん	発芽前	ミカンハダニ	マシン油乳剤97%	60倍	—
	発芽後	カイガラムシ類		100倍	—
中晩柑	発芽直前	かいよう病	ICボルドー66D	60倍	—

※ボルドー剤とマシン油を散布する場合は2週間間隔をあける。また、マシン油乳剤を先に散布した場合は薬剤が弾かれてしまうため1ヶ月以上間隔をあける。



● 落葉果樹

作物名	散布時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用基準
いちじく	発芽前	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	7倍	発芽前
柿	3月中旬				
梅	葉芽発芽前	かいよう病	Zボルドー又はICボルドー66D	500倍	—
				50倍	—
	3月中旬	灰色カビ病	ロブラール水和剤	1,500倍	45日-2回
ぶどう	3月上中旬	黒とう病 晩腐病	ベフラン液剤25 または ベンレート水和剤	250倍 200倍	休眠期-1回
		ハダニ類 カイガラムシ類	石灰硫黄合剤	7倍	発芽前
桃	3月上旬	縮葉病	ICボルドー412	50倍	開花前-3回

※ぶどうで上記を混用する場合は、まずベフラン液剤又はベンレート水和剤を溶かしてから、石灰硫黄合剤を加えて薬剤を調整する。また、石灰硫黄合剤を使用する場合は周囲に十分気を付けて使用して下さい。車に付着した場合汚れが非常にとりにくく、また残った農薬は河川に流さず必ず圃場内で処理するようにしてください。

● 春肥の施用 3月中旬頃実施してください。

青島温州	みかん80ペレット	7袋/10a
不知火・はるみ	みかん80ペレット	6袋/10a
早生温州	みかん80ペレット	5袋/10a
いちじく	静岡フルーツペレット	6袋/10a
柿	静岡フルーツペレット	3袋/10a



JA静岡市女性部しづはたブロック 女性部コーナー令和2年2月号



1/29 しづはたブロック、2/6 梅ヶ島地区、それぞれにて、役員会を行い、令和2年度の新役員様が決定しました。元年度役員の皆様1年間ご苦勞様でした。いろんな場面で何度も助けていただきました。本当にありがとうございました。今後も、引き続き、女性部活動やJA事業にもご協力をお願い致します。

行事予定

- 2月26日(水) 女性部活動事例発表大会 グランシップ 10:30
- 2月26日(水) 婦人科検診 梅ヶ島地区 厚生病院 12:30
- 3月3日(火) JA静岡市女性部 東伊豆雛祭り視察 本部委員 7:20 美和
- 3月7日(土) しづはたバルーンチーム反省会 わら路 18:00~
- 3月11日(水) 北部料理教室反省会 場所 静岡そだち
- 3月12日(水) 元年度しづはたブロック女性部役員慰勞会「無庵」 17:00
- 3月22日(日) 梅ヶ島梅園 『梅まつり』 9:00 開園
- 3月24日(火) JA静岡市女性部 新、旧 本部委員会 13:30~
- 3月25日(水) しづはた支部ソーセージ作り教室 本店 13:30~
- 3月26日(木) しづはた支部ソーセージ作り教室 本店 13:30~
- 3月27日(金) 梅ヶ島女性部総会 梅ヶ島支店 18:00~
- 4月3日(金) 元年度しづはたブロック女性部総会 しづはた支店 14:00

教養講座&サークル

- 3/9(月) 健康体操教室 19:30~ しづはた支店
- 3/14、28(金) 書道教室 19:00~ 昭府町支店
- 4/1(水) フラワーアレンジ教室 昭府町 13:30~ しづはた 19:00~

☆お知らせ☆

令和2年度しづはたブロック総会は
4月3日です!
大河内と梅ヶ島も合同です

〔特集〕あなたの知らない豆腐のおいしい食べ方
伝統の豆腐スイーツが登場。さらさらふわの豆腐に少し手を加えるだけで、「ほんとうに豆腐なの?」と驚かれることまちがいないの新食感へと変身させる方法

3月の家の光
読みどころ