

長田営農経済センターだより



発行：令和2年3月19日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.248

センター長 高橋	TAC・青壮年部 山森	柑橘 杉山	苺・水稲・蔬菜 熊ヶ谷・杉山	落葉果樹・茶・有害鳥獣 森
女性部 山本	購 買 畑沢・岡田・岡部・糟屋・田中			

いちご (担当：熊ヶ谷・杉山)



[今後の管理]


- アザミウマ、ハダニが多発！早期発見をし、防除に努めましょう
- 根の更新、病害虫防除のため下葉を除去しましょう
- 灰色カビ病の対策として換気を適宜おこない、雨の続いた日は灌水を控えましょう

[親株管理]

- 充実したランナーを発生させるために、4月上旬には親株の定植を完了しましょう
- 育苗資材はイチバン(500~1000倍)で消毒してから使用しましょう
- 肥切れを防ぐため、施肥管理に気をつけましょう
(元肥タイプ) 新エコロング413(140日) 10g/株
エコロングトータル(140日) ※微量要素入り
(追肥タイプ) IB化成 4~6粒/株(2週間間隔)

病害虫	薬剤名	倍数	使用基準	蜜蜂	天敵	備考
ハダニ類	マイトコーネ	1000倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
	ダニサラバフロアブル	1000倍	前日-2回	1日	○	卵・幼・成
アザミウマ	カウンター乳剤	2000倍	前日-4回	1日	○	遅効性
	ファインセーブフロアブル【印】	1000倍	前日-3回	1日	○	遅効性
うどんこ病 灰色カビ病	アフェットフロアブル	2000倍	前日-3回	1日	○	予防
	スミレックスくん煙顆粒	6g/100m ³	前日-3回	1日	○	予防
	フルピカくん煙剤【印】	50g/500m ³	前日-3回	1日	○	予防

サトイモ (担当：山森 杉山)



① 種の準備

- 種芋を6kg/1aを準備しましょう
- 芽出しをする場合、日当たりの良い畑に苗床(催芽床)を作り、トンネル被覆をしましょう

② 畑作り・元肥施用

- 植付け2週間前…みのり堆肥 100kg、苦土セルカ2号 10kgを施用しましょう(1a当たり)
- 植付け1週間前…果菜配合3号を 15kgを施用しましょう(1a当たり)

柑橘 (担当：杉山)

品 種	時 期	病害虫名	薬 剤 名	倍 数	使用基準
温州みかん 中晩柑類	4月中下旬	ハダニ類	マシン油(97%)	1000倍	—
		カイガラムシ類	アプロードフロアブル	1000倍	45日-3回

*マシン油とアプロードFを混用することにより、5月中下旬から6月上中旬に発生するカイガラムシの第一世代幼虫に高い防除効果が期待できます。

*温州ミカンのそうか病多発園ではマネージDF・フロンサイド・パレード等を混用散布しましょう。

※デラン、マネージは製造元が営業できなくなったため在庫限りの供給となります

*マシン油とICボルドー66Dの近接散布は14日以上あけましょう。

*緑化促進・花芽充実・・・リンクエース(葉面散布剤)1000倍(単用で散布)

落葉果樹 (担当：森)

作物	使用時期	病害虫名	薬 剤 名	倍 数	使用基準	
桃	4月中旬	モモハモグリガとシンクイムシの防除に交信攪乱剤を設置しましょう コンフューザーMM ⇒10aあたり100~120本				
	4月中旬	タンソ病・灰星病 アブラムシ類 せん孔細菌病	フリントフロアブル25 モスピラン顆粒水溶剤【印】 マイコシールド(混用可)	2000倍 2000倍 2000倍	前日-3回 前日-3回 21日-5回	
梨	4月上旬 (鱗片脱落期)	黒星病/赤星病 アブラムシ類 シンクイムシ	ベルコート水和剤 モスピラン顆粒水溶剤【印】 (混用可)	1500倍 4000倍	14日-5回 前日-3回	
	4月中旬 (開花期)	黒星病	スコア顆粒水和剤	4000倍	14日-3回	
	4月下旬 (落弁期)	黒星病・赤星病 アブラムシ類	オーシャイン水和剤 オリオン水和剤40【印】 (混用時はよく攪拌する)	4000倍 1000倍	前日-5回 3日-2回	
ハイワード	開花前まで	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ(必ず混用)	2000倍 1000倍	— —	
	4月下旬	花腐細菌病	主幹部に環状剥皮処理(幅0.5~1cm)			
東京 コールド	レイン ボー	開花前まで	かいよう病	コサイド3000 バイカルティ(必ず混用)	2000倍 1000倍	— —
		3月下旬	灰色カビ病 果実軟腐病	ベルコート水和剤	1000倍	前日-5回
イチ ジク		発芽期	アブラムシ	アディオン乳剤	2000倍	前日-2回
梅	4月上旬	黒星病 アブラムシ	ベルコート水和剤 アクタラ顆粒水溶剤(混用可)	2000倍 3000倍	30日-3回 7日-2回	
	4月下旬	黒星病 カイヨウ病	スコア顆粒水和剤 スターナ水和剤(混用可)	3000倍 1000倍	前日-3回 7日-3回	

水稻 (担当: 熊ヶ谷・杉山)

～水稻種子の芽出しについて～

近年、猛暑の影響で休眠が深くなっている種子があるので、確実に芽出しをしましょう

- ① 種子消毒を確実にいきましょう
- ② 浸種時の水温は10℃以上を確保しましょう
- ③ 浸種積算温度の目安100℃が目安になります
- ④ 種子の発芽を確認し、確実に発芽させましょう

水稻の準備は計画的に!

- ① 苗箱などの資材はイチバン(1000倍)に浸漬し、消毒しておきましょう
 - ② 田植えに向けて荒起こしをし、田植えの準備を進めましょう
 - ③ 土壌改良資材を投与し、土作りをしましょう
- オススメ資材: とれ太郎 3袋/10a



茶 (担当: 森)

【施肥】 1茶芽出し肥 1回目…3月下旬～萌芽期 ニューほんやま等の化成肥料
1茶芽出し肥 2回目…摘採14～20日前 3袋/10a

茶生産者の方へ

令和2年茶期が近づいております。茶製造前の工場内掃除は丁寧に行ってください。特に粗揉機や揉捻機の中・火炉の部分・棚の乾燥機の中等の部分は念入りに行ってください。

防除時期	対象病害虫	使用薬剤名	散布濃度	使用方法	使用基準
3月中・下旬 (萌芽前)	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2000倍	単用	14日-1回

効果→殺卵・殺幼虫が主(散布により成虫には効果は低いが、成虫が卵を産んでもふ化を抑制)

裾部や葉裏には農薬を丁寧に散布してください。

◎農薬ごとの使用基準・摘採前日数に、ご注意ください。

購買事業からのお知らせ

〈購買店舗 営業日程のご案内〉

決算棚卸のため

3月31日(火) 12時閉店

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

〈人気のお徳用「お茶詰め放題」を実施致します!〉

日時: 4月15日(水)・16日(木)

また、飲料も多く取り揃えてありますので、ぜひご利用ください!

有害鳥獣駆除実施について

- ・カラス・ヒヨドリ捕獲申請 3月15日～5月31日まで(長田西・南嶺友会)
- ・2月～3月15日現在 捕獲報告0件 被害情報も特にありませんでした。
今後、被害・目撃情報がありましたら担当 森までお知らせください。

実施期間中の事故がないよう皆様の協力をよろしくお願いします

お買い得肥料のご紹介

★ストロングバランス★

1,991円

- ・石灰質+・苦土分 + ミネラル
- ・石灰苦土と同時にミネラル分も補給!
- ・微量元素欠乏の出やすい作物に!



★彩輝(さいき)プラス★

1,498円

- ・N8-P6-K6
- ・ロング肥料10%配合 (90日)
- ・元肥につかやすい! (10kg)



★スクラム444★

1,529円

- ・N14-P14-K14
- ・安心安全な速効性の国産高度化成!
- ・野菜他、あらゆる作物に使用できる♪

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です