

# くじらがし いけ

3月18日号

しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330 FAX294-1635

センター長	茶	野菜・水稲・苺	果樹・有害鳥獣	女性部	購買
伊藤	佐藤・武田	松尾	原田	漆畑	橋本・萩原 正込
配送	加藤・長谷川	大河内地区担当	滝浪	梅ヶ島地区担当	望月

## 営業時間変更のお知らせ

しづはた営農経済センターの決算棚卸のため、3/31(火)購買店の営業時間は12時までとなります。ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い致します。

## 《茶》1番茶摘採に向けて重要な管理の時期です。

近年の茶況は大変厳しいです。本年も、より一層厳しいと予想されますので、少しでも茶管理を怠らないようにお願いします。

### オススメの摘採適期

4葉期…1芯2葉～3葉



### ☆もう一度、1番茶が始まる前に確認を！！

- 古葉や木茎が混入しないように、摘採面のチェック！！
- ミル芽摘採の奨励・適期摘採に心がけ、刈遅れが無いように摘採
- 自園・共同工場の製茶機械においても掃除の徹底！！
- 通常の摘採よりも少し早く始め、ミル芽摘採に心掛ける
- 防霜棚・防霜ファンなどを使用し、防霜対策の徹底に努める



今から準備すれば間に合います！！  
少しの事が荒茶単価を左右します！！

### 〔施肥〕1番茶の生育・品質・収量に関わる大切な肥培管理です。

芽出肥 1回目 3月下旬（山間地 4月上旬） 化成 3～4袋／10a  
※みのり1番（省力型肥料） 萌芽期（摘採35日前）

やや早めがオススメ 6袋／10a

施肥後は根を傷めない程度に、土と軽く混和してください。

芽出し肥 2回目 摘採20日前（硫安など速効性化成） 3～4袋／10a

### 〔病害虫防除〕

カンザワハダニの発生が早く、密度が多くなる傾向です。高品質な1番茶の生葉を摘採するためにしっかりと防除を行いましょ！

☆カンザワハダニ 3月中旬 バロックフロアブル 2,000倍 14日 単用

※バロックフロアブルは殺卵・殺幼虫効果主体であり、成虫には効果がないがその成虫が産んだ卵はふ化しない。

### ☆POINTその他ダニ防除について☆

※ 摘採前にダニが発生した時 圃コテツフロアブル 2,000倍 7日 を単用散布する。

※ ダニ類の多発した時 ミルベノック乳剤 1,000倍 7日 を単用散布する。

1番茶前の病気の対策が効果的です！！

☆もち病が気になる茶園 萌芽期まで ドイツボルドーA 500倍 単用 14日

※ボルドー液は葉や芽を汚し跡が残りやすいので、早めの散布を心掛けて下さい。

### ☆チャトゲコナジラミ

チャトゲコナジラミ ダニゲッターフロアブル 2000倍 7日 単用

多発生・増殖を防ぐ為にも地域単位での徹底防除を心掛けて下さい。

スソ以外にも茶樹冠部まで『すす病』が発生している茶園が目立ちます。樹冠部まで『すす病』が発生すると収量・品質に悪影響を及ぼします。

■ ■ 必ず1年に1回以上点検を行いましょ！！ ■ ■ ■

### 〔凍霜害対策〕

3月中ごろからの「おそ霜予報」に注意して、凍霜害対策をして下さい。

### ◎降霜が予想される気象条件

※移動性高気圧が日本列島を覆い、夕方の湿度が比較的低く、午後6時の湿球温度が6℃以下のとき。

※夜間を通じて、快晴または晴れて上空に雲がなく、風が弱いとき。

### 〔防霜ファンのセット〕

3月中旬を目安に電源オン（萌芽2週間前）

温度設定の例 3月中～下旬 3℃ / 4月上～中旬 4℃ / 4月中旬～ 5℃

### 〔製茶機械等の掃除・点検・確認〕

茶期も近くなりました。稼働初日からスムーズに製造ができるように、事前の掃除・点検は念入りに行って下さい。必要諸材料の準備や在庫確認もお願い致します。

◇茶ぼこりの除去（火炉注意） ◇重油・ガスの確認 ◇バネ圧、葉ざらいの間隔、風量の点検

◇回転数の確認 ◇各種ベルトのたるみ破損の確認 等

調整が必要な方は、しづはた営農経済センターへご連絡下さい。

### 茶栽培履歴(防除・施肥作業記録用紙)提出のお願い

茶園管理作業等でお忙しい時期ですが、施肥・防除管理終了後、ただちに作業記録用紙に記帳し、最寄りの農協までご提出をご協力お願いします。

茶商からの栽培履歴開示請求に迅速に対応し、相互の信頼関係を築いていき、より強固な販売体制を作っていきます。



### 提出時期

一茶期前の防除管理終了後、ただちに

### 提出先

しづはた支店・大河内事務所・梅ヶ島事務所

※ 共同工場は各組織ごとに栽培日誌の取りまとめをお願いします。

※農協共販では荒茶出荷時前までに生産履歴の提出が必要となりますので、必ず提出にご協力下さい。未提出の方については出荷ができません。

※3/26に開催を予定しておりましたグリーンティーフォーラム2020は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、皆様の健康面・安全面を最優先すべきとの判断から中止する事を決定しました。皆様にはご迷惑をおかけしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

## 《水 稲》

土作り資材の施用 珪酸資材の投入



農力アップ 珪力燐	5袋/10a	病害に強くなる 倒伏しにくくなる 食味が向上する
とれ太郎 ←省力型土作り資材 けい酸加里プレミア	3袋/10a	

倒伏防止と食味向上 マリンハート施肥時：珪酸資材は半分量に減肥でも可

マリンハート（結成カリマグ）	5袋/10a	倒伏防止、食味向上
----------------	--------	-----------

## 《玉 葱》

病害虫防除

腐敗病 軟腐病	アグリマイシン 100	1,000 倍	7日-5回以内	交互散布
	カスミンボルドー	1,000 倍	14日前-無制限	
白色疫病 べと病	リドミルゴールドMZ	1,000 倍	7日-5回以内	

## 《ナス・キュウリ・にがうり・トマト・ミニトマト》

病害虫防除

アブラムシ・コナジラミ・ アザミウマ類	アドマイヤー1 粒剤	1~2g/株	定植時
------------------------	------------	--------	-----



## 《ほうれん草》

病害虫防除

タネバエ	ダイアジノン5粒剤	6kg/10a	播種時	
コナダニ類	アフーム乳剤	2,000 倍	2回以内	収穫3日前まで

## 《枝 豆》

病害虫防除

タネバエ	ダイアジノン5粒剤	4~6kg/10a	播種前
------	-----------	-----------	-----

## 《香花、榊、シバ》（茶園隣接圃場では農薬散布ドリフト注意!!!）

病害虫防除

グンバイムシ類	スミチオン乳剤	1,000倍	
サビダニ	劇コテツフロアブル	2,000倍	刈アザミウマ可

## 《アスパラガス》

今年は気温が高く、萌芽が早くから始まった圃場もあります。

春芽が出てきたら十分灌水し、ハウスやトンネルを閉め切り、『蒸しこみ』をしましょう。

蒸し込み終了後、25℃を目安にトンネルやハウスの開閉を行い、温度管理してください。

《いちご》☆近況☆ 天気の悪い日が続くと、灰カビが発生しやすい環境になります。症状が出ている箇所はすぐに除去し、ハウスの外に出してからロプラールやスミレックスくん煙でハウスごと消毒をしてください！また、ダニが消えていない圃場についても徹底防除おねがいします。

○今後の管理 （1）本圃の管理：下葉・果房の除去や芽の整理を行う。

（2）特にスリップス、ダニなどの病害虫防除に努める。

サイドの換気と伴に害虫が飛び込みますので注意して観察してください。

（3）気温が少しずつ上がってきました。温度管理、灌水量に注意してください。

高設の方は排液量のチェックをしてください。

（4）次年度用の親株は雨除け下で管理し、採苗床の準備をする。資材はイチバンで消毒を！（紅ほっぺは早出しを狙う為、遅くとも3月中もしくは、4月最上旬に定植してください。）

★★★炭疽病対策：プランター等へ親株定植後培土量の10%程度の「いちごいちえ」を覆土

「いちごいちえ」：炭疽病発病を軽減する為の資材です。＜薬剤散布も併用＞

親株を雨除け下へ置くことでかなり保菌率を下げる事が出来ます。

※「いちごいちえ」が厚すぎると下の根まで水が届かないことがありますので、土が隠れる程度にしてください。

生物薬剤：タフパールは3週間ごとに1度、日没2時間前に散布し散布後8時間は葉面灌水を避ける。殺菌剤（ポトキラー以外）との混用はできません。展着剤はクミテンなどを使用し、浸透性の展着剤は使用できません。

病害虫防除 残された使用回数を確認して散布してください。

☆収穫中につき、果実の汚れを考慮した倍率にしてあります☆

炭疽病	(治療)ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000 倍	灰カビにも効果あり
うどんこ病	(予防)アフエットフロアブル	2,000 倍	灰カビにも効果あり
	(予防)パンチョTF顆粒水和剤	2,000 倍	
	(治療)サンクリスタル乳剤	500 倍	ジーファイン 1,500 倍と混用
灰色かび病	(予防)スミレックスくん煙剤	6g/100m <sup>3</sup>	うどんこ病にも効果有り
	(予防)カンタストライフ	1,500 倍	
灰色かび病	(予防)フルピカフロアブル	2,000 倍	果実の汚れに注意
	うどんこ病 (予防)フルピカくん煙剤	50g/500m <sup>3</sup>	

灰色カビ対策：果房に被さる下葉は除去、感染源は処分しハウス内の喚起を図る。

ハダニ・アブラムシ・ヨトウ・スリップス・コナジラミ 《特に奇形果防止：スリップス要防除》

薬 剤	倍 率	ハダニ	アブラ	ヨトウ	スリップス	コナジラミ	蜂	天敵
コロマイト水和剤	2,000 倍	○					1日	14日
ダニコングフロアブル	3,000 倍	○					1日	1日
スピノエース顆粒水和剤	5,000 倍				◎		3日	1日
ロムダンフロアブル	2,000 倍			○			1日	○
アーデント水和剤	1,000 倍	○	○		○		3日	×
チェス顆粒水和剤	5,000 倍		○			○	1日	○

天敵（チリカブリダニ）に影響の少ないダニ剤

テデオ水和剤 ニッソラン水和剤 ダニサラバフロアブル スターマイトフロアブル

マイトコーネフロアブル カネマイトフロアブル アカリタッチ乳剤 エコピタ液剤

ダニに有効な展着剤：ブレイクスルー スカッシュ 但しアミスター等の殺菌剤等の混用は薬害を生じる恐れあり

※ダニに影響がある展着剤は天敵にも影響があります。

農薬以外の忌避資材：トップハーベスト 1,000倍 + 福磨 500~1,000倍

灰カビ、うどんこ、ダニ、アブラムシ、オンシツコナジラミ 等

◀柑橘・果樹▶

3月終盤になり、剪定作業が終盤にさしかかっている頃合いだと思います。4月に入ると、みかんの防除では主にダニ類の防除となります。使用する農薬はマシン油乳剤になりますが、防除を行う場合は天候に注意して防除適期を逃さぬように実施してください。

○柑橘《防除》

作物名	散布時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
温州みかん	4月中・下旬	ハダニ類 カイガラムシ類	マシン油乳剤97%	100倍	3回
			アブロードフロアブル	1,000倍	14日-3回
中晩柑	4月中旬	ハダニ類 カイガラムシ類	マシン油乳剤97%	100倍	3回
			アブロードフロアブル	1,000倍	45日-3回

☑3月にボルドー剤を散布した園地は2週間間隔をあけてマシン油乳剤を散布する。

☑ハダニ類の防除適期は春芽が5mm~1mm程度に揃った時期が散布のタイミングです！

☑そうか病発生園では4月にマネーシドライフロアブル(6,000倍 30日-3回)を散布、多発園地では劇デランフロアブル(1,000倍 30日-3回)で防除を行う。

☆そうか病防除の上記2つの農薬は在庫に限りがあります。4月のマネーシドライフロアブルの代用にパレード15フロアブル(3,000倍 7日-2回)、デランフロアブルの代用にフロンサイドSC(2,000倍 30日-1回)を使用して下さい。

●落葉果樹

作物名	散布時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
露地いちじく	4月中旬	アブラムシ類	アーデント水和剤 又はアディオン乳剤	1,000倍 2,000倍	前日-2回
ハウスいちじく	4月上旬	疫病	Zボルドー クレフノン	1,000倍 200倍	—
	4月中旬	カンザワハダニ	バロックフロアブル	2,000倍	前日-1回
	4月下旬	アザミウマ類	劇モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日-3回
梅	4月上旬	黒星病	ベルコートフロアブル	2,000倍	30日-3回
	4月中旬	黒星病	トップジンM水和剤	1,000倍	21日-3回
		アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	3,000倍	7日-2回
梨(幸水・豊水)	4月上旬	(鱗片脱落樹) 黒星病	ベルコート水和剤	1,500倍	14日-5回
		アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	前日-3回
	4月中旬	(開花期) 黒星病・赤星病	スコア顆粒水和剤	4,000倍	14日-3回
4月下旬	(落弁期) 黒星病・赤星病	アンビルフロアブル	2,000倍	7日-3回	



JA静岡市女性部しづはたブロック

女性部コーナー3月



今年はお茶時期が早くなりそうですね。令和元年度は、大河内地区と、梅ヶ島地区が合併して1ブロック1支部制になりスタートしました。ブロック旅行(メロン狩り&小野商店)やボウリング大会など、少しずつですが、会話を交わしてみると「あら、あそこの誰々、だとか？」知りあいだったり、とっても身近になった人たちもいました。役員会では、エークックのお鍋の講習会を通じて、とても楽しく交流をすることができました。2年度も、今まで以上に盛り上がりましょうね。元年度は、コロナウィルスの感染防止の影響で、いろんな行事が中止になり役員様には度々ご迷惑をおかけ致しました。申し訳ございませんでした。4/3(金)は、しづはた女性部の総会を、縮小ですが開催されることになっています。気持ちを新たに進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

行事予定

4月 3日(金) しづはた支部総会 13:30受付 14:00開始しづはた支店  
4月 15日(水) JA静岡市本店通常総代会 13:00~ 本店

教養講座&サークル

また、回覧します

〔別冊付録〕

めざせ！卵焼きの達人

みんなが大好きな卵焼き。材料こそシンプルですが上手に焼くのは意外と難しいものです。「おいしい卵焼きは時間がたってもみずみずしく、やわらかな食感が続きます」と、料理研究家・瀬尾幸子さんは言います。

『親と子の“ちよん”といふ片づけ計画』親子の間で「片づけ」について話し合ったことはありませんか？整頓された部屋ですっきり暮らしたい気持ちにはだれでも同じはずなのに、「いざ“実家の片づけ”となるとなぜか親子の意見はすれ違いがち。「片づけてよ！」「放っといて！」と思わぬバトルが勃発することも

特集

