

# 長田営農経済センターだより

発行：令和2年6月19日 電話：259-3233 Fax：259-3164



|                        |     |    |              |             |     |
|------------------------|-----|----|--------------|-------------|-----|
| センター長                  | TAC | 柑橘 | 苺・水稲・蔬菜・青壮年部 | 落葉果樹・茶・有害鳥獣 | 女性部 |
| 畑澤                     | 山森  | 高橋 | 山森・大塚        | 森           | 山本  |
| 購 買                    |     |    |              |             |     |
| 岡田 ・ 石原 ・ 岡部 ・ 糟屋 ・ 田中 |     |    |              |             |     |

## 水 稻 ( 担当：山森・大塚 )

- ガス抜き  
水田に入って、足跡から泡（ガス）が出てきたら、一度落水しガスを抜く
- 中干し  
田植えから30～35日後、1株18～20本の「分けつ」を確保したら、地面がヒビ割れする程度に中干しする
- 病害虫防除（下記薬剤は混用可、7月下旬を目安に散布する）

| 摘要   | 液剤の場合       | 使用基準              | 早生 | 中・晩生 |
|------|-------------|-------------------|----|------|
| ウンカ等 | トレボン乳剤      | 1000～2000倍-14日-3回 | ○  | ○    |
| 紋枯病  | モンカットフロアブル  | 1000～1500倍-14日-3回 | ○  | ○    |
| いもち病 | ダブルカットフロアブル | 1000倍-穂揃期-2回      | ○  |      |

※ 早生品種は3種混用、中・晩生品種はモンカットFL・トレボン乳剤の2種混用で散布する

### (4) 体系処理の場合の後期除草剤

| 雑草の種類     | 除草剤       | 薬量(10a当)      | 処理時期            | 備 考       |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| ヒエ専用      | クリンチャーEW  | 100ml/25～100ℓ | 田植後20日～30日前     | ノビエ6葉期まで  |
| 広葉雑草      | MCPソーダ塩   | 200g/70～100ℓ  | 有効分けつ終止期、収穫60日前 | 落水散布      |
| ワダカ・加グワなど | アトトリ1キロ粒剤 | 1kg           | 田植後20日～収穫45日前   | 水がある状態で使用 |

## いちご ( 担当：山森・大塚 ) 本圃に病害虫を持ち込まないよう、徹底的に防除する！

- 炭疽病を発生させないために、葉かきの作業後には薬剤散布し、雨の日は作業を避ける
- ハウス内が高温にならないよう、寒冷紗をして温度を下げる
- 親株の肥料が切れないように、1B化成の追肥を2週間間隔で4～6粒施用する




### 炭疽病防除

| 月 | 週 | FRAC | 殺菌剤          | 使用倍率     | 使用時期  | 使用基準 |
|---|---|------|--------------|----------|-------|------|
| 7 | 1 | M03  | アントラコール顆粒水和剤 | 500倍     | 仮植栽培期 | 6    |
| 7 | 2 | 11   | ファンタジスタ顆粒水和剤 | 2000倍    | 前日    | 3    |
| 7 | 3 | M07  | ベルコート水和剤     | 1000倍    | 定植前   | 5    |
| 7 | 4 | M01  | キノンドーフロアブル   | 500～800倍 | 育苗期   | 3    |

## RACコードをご存知ですか？

RACコードとは、同じ作用性の農薬グループを一つにまとめて、それぞれの農薬につけられた分類コードのことをいいます。

薬剤防除を実施する際は、本コードで系統を確認し、同一系統の薬剤の連用は避け、系統の異なる薬剤を組み合わせることで薬剤抵抗性がつきにくくなります。



## 落葉果樹 ( 担当：森 )

| 作物                             | 使用時期  | 病 害 虫                          | 薬 剤 名                                  | 使用倍数                     | 使用基準                     |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 桃                              | 7月 上中旬<br>収穫後   | カイガラムシ類<br>シンクイムシ類(発生園)<br>展着剤 | アプロードエースフロアブル<br>スタークル顆粒水溶剤<br>ブレイクスルー | 1000倍<br>2000倍<br>10000倍 | 14日-1回<br>前日-3回<br>—     |
|                                | カイガラムシは孵化直後が一番の防除適期です。詳しくは営農センターへお問い合わせ下さい。<br>※収穫後の施肥管理 7月上中旬 桃夏ペレット 10aあたり6袋(樹勢維持のため収穫後早めに施用) |                                |  |                          |                          |
| 梨                              | 7月 上旬<br>混用可  | 輪紋病・黒斑病<br>ハマキムシ、シンクイムシ        | ベンレート水和剤<br>フェニックスフロアブル                | 3000倍<br>4000倍           | 前日-4回<br>前日-2回           |
|                                | 7月 中旬<br>混用可  | 輪紋病・黒斑病<br>ハマキムシ、シンクイムシ        | ストロビードライフロアブル<br>テルスター水和剤              | 3000倍<br>1000倍           | 前日-3回<br>前日-2回           |
|                                | 7月 下旬   | シンクイムシ類                        | スタークル顆粒水溶剤                             | 2000倍                    | 前日-3回                    |
| キウイ                            | 7月 上中旬<br>混用可   | 果実軟腐病<br>カイガラムシ                | ロブラール水和剤<br>アプロード水和剤                   | 1000倍<br>1000倍           | 前日-4回<br>前日-2回           |
|                                | ※夏季剪定 ⇒ 摘心・間引きにより棚下の明るさを確保、誘引により翌年の優良な結果母枝を確保   |                                |  |                          |                          |
| イチジク                           | 7月 上旬   | さび病<br>黒かび病<br>アザミウマ類          | トリフミン水和剤<br>トップジンM水和剤<br>モスピラン顆粒水溶剤【印】 | 2000倍<br>1000倍<br>2000倍  | 前日-3回<br>7日前-5回<br>前日-3回 |
|                                | 7月 下旬   | 黒かび病                           | ロブラール500アクア                            | 1000倍                    | 3日前-3回                   |
| 柿                              | 7月 上旬   | 落葉病・炭疽病<br>カメムシ(発生した場合)        | ペンコゼブ水和剤<br>スタークル顆粒水溶剤                 | 500倍<br>2000倍            | 45日前-2回<br>前日-3回         |
|                                | 7月 中旬   | カキノヘタムシガ                       | フェニックス顆粒水和剤                            | 4000倍                    | 7日前-2回                   |
| ※夏肥の施用 7月中旬 新FTE S280 10aあたり3袋 |   |                                |  |                          |                          |

## 〈第44回 静岡県桃果実品評会結果 令和2年6月16日開催〉

|      |                                  |      |       |
|------|----------------------------------|------|-------|
| 金賞   | 尾崎 寿一                            | 銀賞2席 | 杉山 真美 |
| 銀賞1席 | 杉本 文彦                            | 銀賞3席 | 田形 惇子 |
| 銅賞   | 杉浦辰男・杉山善一郎・杉山幸代・永嶋雄大・池ヶ谷仁三郎・稲野幸子 |      |       |

## 柑 橘 ( 担当：高橋 )

| 品 種                        | 時 期   | 病 害 虫         | 薬 剤 名                   | 倍 数           | 使用基準             |
|----------------------------|-------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 温州みかん                      | 7月上中旬 | 黒点病           | エムダイファー水和剤              | 600倍          | 60日-2回           |
|                            |       | チャノアザミ        | キラップフロアブル               | 2000倍         | 21日-2回           |
|                            |       | カイガラムシ類       | アプロードエースフロアブル           | 1000倍         | 14日-2回           |
| 中晩柑<br>(スガエレガント<br>・不知火 等) | 7月上旬  | かいよう病         | ICボルドー412               | 50倍           | —                |
|                            | 7月中旬  | 黒点病<br>チャノアザミ | エムダイファー水和剤<br>キラップフロアブル | 600倍<br>2000倍 | 90日-4回<br>21日-2回 |

※エムダイファーの使用基準は収穫前60日、極早生(特に日南)はペンコゼブ(30日)を散布する。

※ゴマダラカミキリムシの防除 モスピラン顆粒水溶剤200～400倍を主幹・株元に散布する。14日3回

\*夏肥の施用 7月中旬 スルガエレガント スルガペレット 3袋 /10a  
ポンカン 新FTE S604 2袋 /10a

### \*早期摘果

着果量が多い樹は、樹勢の維持と来年度の収量確保のため、早期摘果を実施しましょう！ 来年の結果母枝を確保するために、7月上中旬に樹冠上部1/3全摘果や枝別全摘果により夏芽の発生を促しましょう。

茶（担当：森）

| 時期                   | 病虫害                                     | 薬剤名                  | 使用倍数           | 使用方法 | 摘採迄の日数 |
|----------------------|---|----------------------|----------------|------|--------|
| 二番茶整枝後               | ハマキムシ類                                  | サムコルフロアブル10          | 2000倍          | 単用   | 3日     |
| 三番茶<br>萌芽期～<br>1葉開葉期 | 炭疽病・もち病<br>新梢枯死症<br>ウンカ・スリップス           | フロンサイドSC<br>コルト顆粒水和剤 | 2000倍<br>2000倍 | 混用   | 14日    |
| 三番茶生育期               | 炭疽病・もち病<br>褐色円星病<br>ウンカ・スリップス<br>ハマキムシ類 | インダーフロアブル<br>ディアナSC  | 5000倍<br>5000倍 | 混用   | 7日     |

輪斑病がある茶園は アミスター20フロアブル 2,000倍（14日-3回）を二番茶整枝直後に散布してください

| 時期     | 病虫害                     | 薬剤名            | 使用倍数  | 使用方法 | 摘採迄の日数 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|------|--------|
| 7月中～下旬 | クワシロカイガラムシ<br>(右記のいずれか) | ※コルト顆粒水和剤      | 2000倍 | 単用   | 7日     |
|        |                         | スプラサイド乳剤【印】    | 1500倍 | 単用   | 14日    |
|        |                         | ※アプロードエースフロアブル | 1000倍 | 単用   | 14日    |

※ の印のある薬剤は、チャトゲコナジラミと同時防除できます

未成熟とうもろこし（スイートコーン）

雄穂の出穂時期から特に害虫の発生が多くなるので注意

雄穂が出穂する頃にデナポン粒剤5、雌穂が出穂する頃にプレバソンフロアブル5の使用がオススメ

| 病虫害    | 薬剤名           | 使用倍数      | 使用基準   |
|--------|---------------|-----------|--------|
| アワノメイガ | デナポン粒剤5       | 4～6kg/10a | 21日-2回 |
|        | プレバソンフロアブル5   | 2000倍     | 前日-3回  |
| アブラムシ  | モスピラン顆粒水溶剤【印】 | 2000倍     | 前日-3回  |

～飲料注文受付中～

塩JOYサポート

495ml × 24本 税込¥1,980

塩分濃度換算0.2%のナトリウムを配合。  
カリウムやカルシウムなどに含まれる  
成分をバランス良く配合したハイポニック  
(体液より低い浸透圧) 飲料。  
さっぱりとしたレモン味。

熱中症対策に！



1ケースから配達します。お電話お待ちしております！

～お知らせ～

★新型コロナウイルス対策の為「JA農業機械大展示会」・JA静岡市「長田ブロック生活事業感謝祭2020」は中止となりました。

★新型コロナウイルス対策「支援金申請」等について別紙お知らせが入りますのでご確認ください。

青色専従者給与源泉所得税申告事務説明会について

| 会場月日 | 会場    | 日             |
|------|-------|---------------|
|      | 長田支店  | 令和2年 7月6日 (月) |
|      | 丸子支店  | 令和2年 7月7日 (火) |
|      | 下川原支店 | 令和2年 7月8日 (水) |

時間 10:00～11:30

※今年度より午前みの受付とさせていただきます。

上記の日程でご都合が悪い方は長田営農センターまでご相談下さい。

持ち物 令和2年度源泉徴収簿 ・ 納付キップ ・ 通帳(事業主) ・ 通帳印  
金融窓口は午後3:00までとなりますのでご注意ください！

新茶の詰め放題・ドリンクの販売について

|    | 7月9日(木)    | 7月10日(金)   | 7月11日(土)       |
|----|------------|------------|----------------|
| 会場 | 長田営農センター   | 長田営農センター   | 長田じまん市店頭(ドリンク) |
| 時間 | 8:15～15:00 | 8:15～15:00 | 8:15～12:00     |

長田有害対策協議会 伝言板

〔有害鳥獣駆除実施について〕



駆除期間 令和2年7月1日～12月31日まで

駆除範囲 長田・丸子一円 駆除対象 イノシシ・ハクビシン・ニホンジカ・アライグマ、サル

※駆除実施期間中のおねがい 期間中に山へ入る場合は、十分注意して下さい！

また、日中は電柵の電源を切るようにお願いします。

捕獲情報

カラス 3/15～5/31 15羽 イノシシ他…なし