

しづはた営農経済センターだより 静岡市葵区下 1459-1 ☎294-9330

センター長	茶	茶・有害鳥獣	野菜・水稲・苺	果樹	女性部	購買
高橋	佐藤	平野	稲葉	伊藤	漆畑	橋本・中村・正込
配送	加藤・長谷川		大河内地区担当	大石	梅ヶ島地区担当	望月

《茶》 来年の1番茶土台となる三番茶（母枝）を作る重要な時期です。
《防除》 梅雨時期の病害虫防除が今後の生育と翌年の1番茶に影響します。

◎ 2茶摘採後（整枝後）

2茶摘採後、黒褐色に枝が変色するのは輪斑病が侵入可能性アリ

ハマキムシ類	サムコルフロアブル	2,000倍
輪斑病	アミスター20フロアブル	2,000倍

※アミスター20は、輪斑病に対して整枝後2～3日でも効果があります。

◎ 3茶萌芽期～1葉期

炭そ病・もち病・新梢枯死症	フロンサイドSC	2,000倍	14日
ウンカ・スリップス	コルト顆粒水和剤	2,000倍	混用

☆モチ病の発生が予想される園について（特に露切れの悪い園・山間地は多発生）

防除の度、殺菌剤を使用し、下記の通りの治療効果がある剤が有効です。

◎オンリーワンフロアブル	2,000倍	7日
◎インダーフロアブル	5,000倍	7日
◎スコア顆粒水和剤	2,000倍	7日

（殺菌剤は多少の降雨でも効果はあります！！）

※病気の症状が発生しなくとも、**ドイツボルドーA 500倍**を早めに散布するのも有効です。

☆1番茶後更新園 更新園でヨモギエダシャクが発生している茶園

MR. ジョーカー水和剤 2,000倍 21日（ウンカ・スリップス・ハマキ類の同時防除可）

《2番茶を摘採しない茶園の整枝》

◎時期 6月下旬～7月最上旬（2茶芽が出揃った頃）

◎整枝位置 一番茶摘採位置よりやや深め（1番茶葉を無くす位の浅刈り）

※山間地については、秋整枝の時期までが短い為2番茶芽を2節残す程度の整枝

《1番茶後更新園の整枝》

◎時期 再生芽が平均15cm程度伸びた頃

（葉が5～6枚着くとともに、再生芽下部が青茎から木化した頃）

日数の目安⇒深刈り更新・・・更新後50～60日後

中切り更新・・・更新後60～70日後

日数よりも芽の大きさを優先して下さい。

◎位置 更新した位置より5cm程度上（新葉2程度残る高さ）

※生育が遅く、7月末までに再生芽が十分に伸びない場合、秋に整枝をしてください。

土壌診断 随時、受付中！

例年7月に行われた土壌診断ですがコロナの影響により実施できないため、随時、受付を致します。一検体につき手数料が400円かかりますのでご注意ください。

- ① 土壌を採取後、陰干しし、フルイにかける
- ② ①を約200g（湯のみ1杯程度）用意
- ③ ビニール袋に住所・氏名・圃場名・作物名を記入 提出先：最寄りの支店へ

コロナ対策給付金の申請を農協で支援いたします

①持続化給付金（締切 令和3年1月15日まで）

- ・今年の1～12月のいずれかの月の売上が前年の平均月売上（事業収入÷12）と比較し、50%以上、下落した方が対象（上限100万円まで助成）

②エール静岡応援金（締切 令和2年8月31日まで）

- ・去年の農業収入が50万以上あり、農業収入が一番多い方で、今年の4月か5月が30%以上減少している方が対象（一律10万円給付）

※大まかな説明ですので、ご自身が対象になるかは営農センターにご相談ください。

※相談される方は、事前に農協へ連絡をして受付予約をお願いします。（294-9330）

コロナ対策給付金 説明会 開催のお知らせ

コロナ対策給付金について対象になりそうな共販組織で随時、説明会を開催しております。この度、詳しい説明を一度も聞いていない方を対象に、下記の通り説明会を実施 致します。是非、ご参加ください。

日時：令和2年7月8日(水) 19時00分～ 会場：しづはた支店2階

日時：令和2年7月9日(木) 13時30分～ 会場：しづはた支店2階

農機具紙上大展示会のお知らせ

今年度は、感染症予防対策により、毎年7月初めに吉田公園で開催の農機具大展示会が中止となりました。代わりに、夏の農業応援キャンペーンとして、農機具紙上大展示会を行います。別添のチラシをご確認ください。


熱中症予防に水分補給を！ 飲料発売中！

静岡茶ボトル缶、香るほっ茶、静岡茶ゆったり、塩JOYなど



暑い夏をJA飲料で乗り切ろう！！ 1ケースから配達いたします！！

《いちご》



【次年度の本圃準備】

1、本圃の除塩（土耕）塩類が集積していると思われる圃場

- ① たん水状態（水田）にする。② ビニールを取り、雨にあてる。
- ③ ソルゴー等を栽培し、圃場の外へ持ち出す。（①～③のうちいずれかの方法で処理する）

2、本圃の消毒

(1) 元肥＋土壌改良剤 ⇒ 灌水 ⇒ マルチ掛け ⇒ 太陽熱処理（最低1ヶ月）ビニール下 ⇒ マルチ除去 ⇒ 有効菌の投入 ⇒ 定植

(2) 農薬による土壌消毒：バスアミド 又は ガスタード 20～30kg/10a 又は
 ディ・トラペック油 30～40 kg /10a ガス抜き後 ⇒ 有効菌の投入 ＋ 元肥 ＋ 土壌改良材等
 クロルピクリン錠剤 10,000錠/10a 被覆して2週間～1ヶ月後 ⇒ 有効菌投入 ＋ 減元肥

おすすめ土改材：あく抜きスーパーベラボン（ヤシ殻）100 L（圧縮時）：90袋/10a

物理的改善に（気層の増加改善）炭素率：藁の3倍 3年毎 畝だけなら30袋/10a

一度に全部入れるわけではなく、少しずつ土と混ぜていくとふかふかの良い土になります。

おすすめ有効菌：ハイフミンハイブリッドG 15 kg 10袋/10a 有効菌で発根促進！



【育苗編】炭疽病防除の注意事項

- 1、露地育苗：雨前後にアビオンE（パラフィン系展着剤）加用で炭疽病防除薬剤散布
葉欠き、芽欠きの後は必ず炭疽病防除！
- 2、雨よけ育苗：室内がハウス環境（高温、多湿）とならないよう注意

～炭疽病散布ローテーション例～

月日	農薬名	RAC	倍率	期間
7月上旬	ベルクートフロアブル	F:M07	1,000倍	育苗期
中旬	ジマンダイセン水和剤	F:M03	600倍	仮植期のみ 又は 76日前
下旬	キノンドーフロアブル	F:M01	500倍	育苗期
8月上旬	劇デランフロアブル	F:M09	1,000倍	育苗期
中旬	ベルクートフロアブル	F:M07	1,000倍	育苗期
下旬	アミスター20フロアブル	F:11	2,000倍	育苗期

《アスパラガス》

雨も多くなるにつれ、カビの発生も多くなってきます。被害が出始める前に徹底防除をお願いします。

病虫害	RAC	農薬名	倍率	備考
ヨトウムシ	I:28	フェニックス顆粒水和剤	2,000倍	前日 - 2回
ネギアザミウマ	I:5	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日 - 2回
灰色カビ病	F:11	アミスター20フロアブル	2,000倍	前日 - 4回

《水稻》

1、除草 用途別除草剤

*MCPはクリンチャーEWと混用可。MCPとグラスジンとはどちらか1回の使用。

2、中干し 田植え後35日頃（分株本数18本）になったら開始する。

ただし、乾田・やせ地については弱く実施！出穂25日前に入水する。

ヒエ（専用）	クリンチャーEW	ノビエ発芽から5葉期まで
浮き草、ヒルムシロ アオミドロ、表層剥離	モゲトン粒剤	部分施用可
イネ科以外の水田雑草	MCP液剤	200ml/10a
	グラスジンM粒剤	落水翌日散布

《野菜》 病虫害防除

トマトの尻腐れ対策：カルクロン（カルシウム資材）400倍 葉面散布 花が咲いた頃が適期
 カルシウム資材を使っても、水の切りすぎで発生します。気をつけて管理をしましょう。

*農薬が異なってもRACコードが同じ種類の農薬を連続で散布すると効果が出にくいので、
 連側で防除を行う場合はRACコードが異なる種類の農薬散布が効率的です。

種類	病虫害	RAC	農薬名	倍率	備考
きゅうり	べと病、黒星病	F:M03	ジマンダイセン水和剤	600倍	斑点細菌効果 前日-2回
	褐斑病、斑点細菌病				
なす	灰色カビ	F:2	ロブラール水和剤	1,000倍	前日-4回
	ハダニ	I:21A	ダニトロンフロアブル	2,000倍	前日-1回
トマト	疫病	F:24 F:M04	カスミンボルドー	1,000倍	前日-5回
枝豆	メイガ、カメムシ	I:3A	トレボン乳剤	1,000倍	21日前-2回
トウモロコシ					7日前-4回

《柑橘》

7月に入り生理落果が終了し、早期摘果作業を行う時期となりました。温州みかんでは、樹の状態を見て摘果を実施。中晩柑類は、一番の肥大時期ですので早期摘果に努めてください。

●温州みかん

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
7月上旬	チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	2,000倍	21日-2回
	カイガラムシ類	トランスフォームF	2,000倍	前日-3回
	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60日-2回

※極早生へ7月15日以降に散布する場合は、ペンコゼブ水和剤600倍を散布。エムダイファー水和剤は、使用しないこと。

浮皮軽減対策としてバイカルティ1,000倍を混用する。

展着剤のアピオンE1,000倍を混合することで農薬の付着期間を向上させます。

●果実品質向上管理

果実の品質向上のためにフィガロン乳剤を2回散布する。

	早生温州	農薬混用時	青島温州
1回目	7/12頃(満開後60日)	2,000倍	3,000倍
2回目	8/1頃(満開後80日)	3,000倍	5,000倍
			7/22頃(満開後70日)
			2,000倍
			8/11頃(満開後90日)
			3,000倍

※樹勢の低下が見られる樹への散布は避ける。また、1回目と2回目の散布期間は20日程度とすること。

あまり間隔が空くと効果が低下しますので注意して下さい。

●中晩柑

防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍率	使用基準
7月上旬	かいう病	ICボルドー412	50倍	—
7月中旬	チャノキイロアザミウマ	キラップフロアブル	2,000倍	21日-2回
	黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	90日-4回

《落葉果樹》

対象作物 防除時期	対象病虫害	農薬名	希釈倍数	使用基準
ハウスいちじく 7月上旬	さび病	アンビルフロアブル	2,000倍	前日-2回
いちじく 7月上旬	アザミウマ類・キボシカミキリ	劇モスピラン顆粒水溶剤	1,000倍	前日-3回
	さび病	トリフミン水和剤	2,000倍	前日-3回
	黒かび病	トップジンM水和剤	1,000倍	7日-5回
7月中旬	カンザワハダニ	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日-1回
7月下旬	黒かび病	ロブラール500アクア	1,000倍	3日-3回
柿 7月上旬	落葉病	エムダイファー水和剤	500倍	45日-2回
	炭疽病	フェニックスフロアブル	4,000倍	7日-2回

7月中旬	ハマキムシ類			
ぶどう 袋掛け後	ハダニ類	カネマイトフロアブル	1,000倍	14日-1日
	ベト病	Zボルドー	800倍	—
着色始め	チャノキイロアザミウマ	コルト顆粒水和剤	3,000倍	前日-3回
	クワシロカイガラムシ			

JA静岡市女性部しづはたブロック



女性部コーナー6月



じめじめしたり、蒸し暑かったりと、体調も壊しやすい時期ですが、皆様お変わりはありませんか。梅ヶ島に登るときや、賤機街道や、大河内地区など畑やお庭などで、私の大好きなアジサイの花を見ることができ、とても癒されます。

行事予定

- 7月9日(木) 梅ヶ島中学校 梅干し作り 13:30~梅ヶ島女性部
- 7月14日(火) 梅ヶ島「秋冬野菜 栽培講習会」10:00~梅ヶ島支店
- 7月14日(火) 大河内「秋冬野菜 栽培講習会」13:30~大河内支店
- 7月15日(水) しづはた「秋冬野菜 栽培講習会」15:00~しづはた支店2階
- 7月15日(水) 静興物産とAFCによる即売会 13:00~しづはた支店2階
- 7月18日(土) アグリスクール 9:00~ しづはた支店2階
- 7月27日(月) 組合員特定健診報告会 13:30~昭府町支店

教養講座&サークル

- 7/10(水) フラワーアレンジ教室 14:00~昭府町支店
 - 7/10(木) フラワーアレンジ教室 19:00~しづはた支店
 - 7/13(月) 健康体操教室 19:30~ 今回は昭府町支店
 - 7/23(木) 絵手紙教室 19:00~ 美和支店
 - 7/27(月) 料理教室 9:30~ 内牧支店
- 書道は募集人数が集まりませんでしたので、お休みします。

☆コロナ補助金☆

- ①持続化給付金
- ②(エール)中小企業事業継続応援金
- ③高収益作物次期作支援策交付金

農協で手続きできます。ご相談ください。

「特集」もう刺され
ないー蚊のトリセツ」
そういえば服の色とか血液型で血を吸われにくいか耳にしたことありませんか

7
読者の光
読みどころ