

わらしな川 7月号

(R2.7.20 発行)

JA静岡市 菓科営農経済センター 指導:279-0772 購買:279-0773 配送:279-0774

センター長	宮原	茶	深井・梶山	野菜・水稲・苺	熊ヶ谷・小澤(TAC)	女性部	平野
購買	市川(服西)・鈴木・横山		地区担当	徳田(南菓科)・鈴木(清沢・大川)			

営農実態調査のお知らせ

7月の訪問日で各戸に配布いたします。内容を確認の上、**8月20日(木)までに** 菓科営農経済センターまたは最寄りの支店へご提出をお願いいたします。

※お手数ですが、変更のない方もご提出ください。

イベント中止のお知らせ

- ・JA静岡市 夏っ得フェア
- ・JA静岡市組合員鮎釣り大会

プラスチックごみ 管理徹底のお願い

農業資材の利用にともない、使用済みのポリ・ビニールなどのプラスチック製品(肥料袋やマルチ、ハウスのビニールなど)は、産業廃棄物として、使用した農業生産者が適切に処分することとなっています。土のうやゴミ袋として圃場で利用する際には、劣化・破碎されて河川に流れたり、風で飛んでしまうことがないようにご注意ください。

皆さまのご協力を積み重ねることが環境を守ることに繋がりますので、何卒宜しくお願い致します。



暑い夏は JA飲料で 乗り切ろう!

リンゴ果汁100%!
リンゴジュース
30本入 3,402円

疲れた時に…
C1000 ビタミンレモン
30本入 2,940円

熱中症予防に…
塩 JOY サポート
24本入 1,980円

子供に人気!
スパークリングみかん
24本入 2,203円



贈答用の包装やのし付けも承っております。お気軽にご注文下さい。☎279-0773

【茶】 ※2茶後の整枝時に、ハマキ食害・新梢枯死症の侵入がありましたので、今後の防除を徹底願います。
※また本年は降雨が続き、病気が発生しやすいので、殺菌剤の散布を徹底して下さい。
※組織加入者等で使用する農薬が定められている場合は、工場基準を遵守してください。

病害虫防除

三番茶萌芽期 ~1葉開葉期	炭そ病、もち病 新梢枯死症	フロンサイドSC	2000倍	・予防剤 ・茎葉の表裏に十分かかるよう散布	混用 14日
	ウンカ、スリップス	コルト顆粒水和剤*	2000倍	・行動制御・浸達性あり	

※コルト顆粒水和剤はチャトゲコナジラミ・クワシロカイガラムシにも効果があります。

★1番茶後の更新茶園は特に芽が生育している時期です。大切に伸ばしたいので徹底防除をお願いします

三番茶生育期	炭そ病、もち病 褐色円星病	インダーフロアブル	5000倍	・治療、予防効果あり	混用 7日
	スリップス ハマキムシ類	ディアナSC	5000倍	・ウンカの発生が懸念される園ではディアナSCに変えてリーズン顆粒水和剤(2,000倍、7日)を散布する	

8月上旬 (お盆前までに)	ハマキムシ類 ・ヨモギエダシヤク	ファルコンフロアブル	4000倍	・食毒、脱皮促進剤(IGR)のため若令幼虫期までの早期防除	単用 7日
------------------	---------------------	------------	-------	-------------------------------	----------

※ ハマキムシ類はこの時期に徹底防除することにより、抑制できます。

※ 適期を逃した場合は、**アフーム乳剤** [2000倍・7日]を使用してください。

7月~9月	マダラカサハラハムシ	※下記のいずれかを散布			・この時期3茶芽より、発生しやすいので、注意して下さい。 ・被害葉が分からない場合は、営農センターへ連絡下さい。
		コテツフロアブル◎	2000倍	7日	
		ハチハチ乳剤◎ エクシレルSE	1000倍 2000倍	14日 7日	

※ 被害症状は成虫が葉の裏側より大小の穴をあけ、ひどい場合は3茶芽が出てこない場合があります。
※ 防除適期は被害が見られ始めたら散布し、朝及び夕方散布が効果的です。(昼間は茶株内に隠れる為)

◎1番茶後中切り更新園の整枝について

- 時期……日数よりも芽の大きさを優先して、再生芽が5~6枚になり葉が硬化した頃(60~70日)
※山間地等では更新後の生育が遅く、7月最下旬までに整枝できない場合はそのままにしておき、秋に整枝を行うようにして下さい
- 位置……更新した位置より葉を1~2枚程度残すよう整枝して下さい。
※今後乾燥等が予想されるので、しっかりと葉層の確保をするようにして下さい。

★クワシロカイガラムシ(第2回目発生期)

時期……7月下旬~8月上旬

薬剤……コルト顆粒水和剤 [2000倍・7日] スプラサイド乳剤 [1500倍・14日] アプロードエースフロアブル[1000倍・14日]

防除適期……産卵開始後7~10日で幼虫になります。この幼虫の時に上記薬剤を散布して下さい
また、2回目は発生時期にムラが見られまますので、2回の防除が有効です。防除適期の確認はクワシロカイガラムシが寄生している枝を営農センターまたは最寄の事業所までお持ち下さい。

◎土壌改良剤の施用について

土壌の酸性を矯正し、肥料の吸収率を高めるために必ず施用して下さい

・時期…8月上旬頃まで(配合を施用する前まで)

・袋数…**苦土セルカ2号 粒(4袋)**、**苦土石灰 粒(4袋)**

※深耕する前に施用するのが、効果的です

※深耕しない茶園でも苦土石灰類を施用した後は、少なくとも5~10cmは耕して土壌と混合する

【水稻】

- 水管理** 中干し後は間断灌水を実施し、根腐れや下葉の枯れ上がりを防いでください。穂前は灌水し、施肥後は3～5日間は湛水状態にし、肥料を効かせます。
- 穂肥** 穂肥の遅れは食味を低下させるので注意しましょう。葉色が濃い場合は1/3程度に減肥してください。穂肥日の目安 6月1日田植の場合 ヒノヒカリ・にこまる・・・8月1日 あいちのかおりSBL・・・8月3日



3. 病害虫防除

液剤	早生	7月下旬～8月上旬 (出穂前)	いもち病	ダブルカット(F)	1000倍	穂揃期
		8月上旬 (出穂直後)	紋枯病 ウンカ・カメムシ類	モンカット(F) トレボン乳剤	1000倍	14日前
中・晩生	8月中旬 (出穂前)	穂枯れ	ブラシン(F)	1000倍	7日前	
		ウンカ・カメムシ類 コブノメイガ・ツマグロヨコバイ	キラップジョーカー(F)	1000倍	14日前	
中・晩生	7月下旬～8月上旬	紋枯病	モンカット(F)	1000倍	14日前	
		ウンカ・カメムシ類	トレボン乳剤	1000倍	14日前	
中・晩生	8月中旬 (出穂前)	いもち病	ダブルカット(F)	1000倍	穂揃期	
		コブノメイガ・カメムシ	キラップジョーカー(F)	1000倍	14日前	
中・晩生	8月下旬～9月上旬	穂枯れ	ブラシン(F)	1000倍	7日前	
		ウンカ・カメムシ	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	7日前	

※ イネツトムシ・コブノメイガの発生が懸念されますので7月下旬～ロムダンソル 1000倍(21日前)を混用して下さい。

※ 早生品種でカメムシの発生が多い場合8月中旬にスタークル顆粒水溶剤 2000倍(7日前)を混用する。

粒剤	7月下旬～8月上旬	紋枯病・いもち	コラトプリンバー粒剤	3kg/10a	出穂30～5日前-2回
		ニカメウチュウ・ウンカ・コブノメイガ	パダントレボン粒剤	3kg/10a	30日前-3回
粒剤	8月中旬 (出穂前)	カメムシ・ウンカ・ツマグロヨコバイ	スタークル粒剤	3kg/10a	7日前-3回

【野菜】

種類	病害虫	農薬名	倍率	使用基準
キュウリ	斑点細菌病	コサイド3000	2000倍	-
	うどんこ病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	4回
ナス	ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	2回
	うどんこ病・灰色かび病	フルピカフロアブル	2000～3000倍	4回
	灰色かび病	スミレックス水和剤	1000～2000倍	6回

全て収穫前日(散布後収穫まで24時間空ける)になります。高温時には薬害が生じる恐れがあるため、早朝や夕方の防除を心がけましょう。

【果樹】

ミカン	8月上旬	コナカイガラムシ(発生園のみ)	スプラサイド乳剤 40	1500倍	14日-4回
	8月中旬	チャノキイロアザミウマ	アクトラ顆粒水溶剤	2000倍	14日-3回
		黒点病	ペンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回
※極早生みかんの防除は、収穫日数を考慮して、薬剤を選定して下さい。					
柿	8月上旬	フジコナカイガラムシ カキノハタムシガ	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日-3回
いちじく	8月上旬	疫病	ランマンフロアブル	2000倍	前日-3回
	8月上旬	アザミウマ類	スピノエース水和剤	5000倍	前日-1回
	8月中旬	さび病	ラリー水和剤	2000倍	前日-4回
ブドウ (屋根樹)	8月上旬 (収穫前)	チャノキイロアザミウマ	ダントツ水溶剤	4000倍	前日-3回
		べと病	ICボルドー66D	50倍	-
		ハダニ類	コロマイト水和剤	2000倍	7日-2回

【女性部】

＜行事・会議＞

8/4(火) 8:30～ 服東 特定健診【薬科】
8/4(火) 14:00～ JA 役員・青壮年部・女性部
意見交換会【本店】
8/7(金) 13:30～ 営農講座【中藁】
8/26(水) 13:00～ 県家の光大会【グランシップ】
8/31(月) 9:30～ サンフラワー定例会【中藁】

＜教養講座＞

一閑張り 8/3(月) 13:30～【中藁】
ピアノ 8/4, 18(火) 13:30～【薬科】
薬科体操 8/4, 18(火) 19:30～【薬科】
清沢体操 8/6, 27(木) 19:30～【清沢】
薬科フラワー 8/11(火) 19:30～【薬科】
清沢フラワー 8/11(火) 19:00～【清沢】
パッチワーク 8/12, 26(水) 9:30～【薬科】
フラダンス 8/20, 27(木) 19:30～【薬科】
書道 8/14, 28(金) 19:30～【薬科】 北部料理 8/17(月) 9:30～【内牧】

【有害鳥獣駆除】

現在、サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・アナグマの野生鳥獣駆除の許可をすべての地域(鳥獣保護区を含む)にて取っています。引き続き、山に入る際には十分気をつけて下さい。駆除のご相談は部農会長を通じて、営農経済センターへご連絡下さい。

※ 近年マダニやヒルが増えていきますので畑や山に入る際は十分注意してください。



200ml 550円

蚊などの脅威からお肌を守ります。サラサラパウダーとひんやり爽快オイル配合。



140ml 1,100円

ヤマヒルからやさしく守ります。粘着力があり効果が長時間持続します。

薬科営農経済センター 購買で販売中!

秋冬野菜 栽培講習会 「プチヴェール」

8月7日(金) 13:30～ 中藁支店

JA指導員が丁寧に説明します。参加者にはプチヴェールの苗を配布します。お申し込みは、女性部回覧、又はお電話にて直接ご連絡下さい。