



センター長	大沼	お茶・果樹	村田	TAC	武田	購買	渡辺	購買	渥美	購買	青島
女性部	市川	苺・蔬菜・水稲	宇佐美	蔬菜・苺 青壮年部	望月	購買・ 地区担当	富永	購買・ 地区担当	山田		

あなたも対象の可能性が有ります！今一度ご確認ください！ご不明な場合はお問合せ下さい。

コロナ支援関係 持続化給付金（最大100万円支給）

昨年より売上が減少していることなどが前提です。

昨年の農業収入を12で割り算出した1月当りの平均額に対し、今年の売上がどこか1カ月でも50%以下になっていれば対象となります。

（例）昨年の年収が120万円の場合

・120万円÷12カ月＝10万円（1月当り平均額） ・10万円×50%＝5万円（月平均の50%）

⇒この場合、今年、どこかの月の売上が5万円以下であれば対象となります（ゼロもOKです）。

例えば、お茶農家で2月が5万円以下、イチゴ農家で8月が5万円以下の売上の方は対象です。

すでに持続化給付金を受給した方へ（節税対策）

受給した給付金は令和2年の農業の雑収入の為、所得税・住民税等に影響します。節税対策として、大きな経費となる設備投資等は本年中に済ませた方が良いでしょう。ご検討下さい。

トラック、農業機械、暑さ対策の空調服など…ご用命は是非農経済センターまでお願いします。

経営継続補助金について（詳細は別紙をご覧ください）

コロナ対策として新たに始まった補助制度です。

省力化等により密を避けコロナのリスクを軽減することが可能な機械等（管理機、トラクター、無人販売機、消毒装置、乗用摘採機等）の導入費用に対し、4分の3が補助されます（上限100万円）。※単なる機械の買い替えやトラック等の車両は対象外です。

※採択には審査があり、コロナ対策として有効なものが優先されます。申請しても補助対象外となる可能性も大きいのでご了承願います。詳細は農経済センターにお問合せ下さい。

『駿府本山秋のお茶まつり』の中止について

毎年11月上旬に駿府城公園内紅葉山庭園茶室「雲海」で開催していましたが『駿府本山 秋のお茶まつり』は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、中止となりましたのでご了承下さい。

★お問合せは…日本茶トラクター協会静岡市支部電話：054-653-3103

お知らせ まだまだ暑い日が続きます!!熱中症にご注意ください!!

暑い季節を乗り切ろう！
静岡茶ボトル缶 (400g×24本) 2,592円(税込)
 地元静岡産の原料を使用した安心なドリンクです。
 農作業のお供に、毎日の健康維持向上にオススメです！

農協飲料の定番！
みかん日和 (190g×30本) 2,570円(税込)
 砂糖由来のイヌリン（食物繊維）を使用し、従来のみかん飲料よりさらにおいしくなりました！

茶

【防除】 共同茶工場に出荷している方は、工場の農薬基準を守りましょう

☆ 8月下旬よりホコリダニ、ハマキムシ類等の発生が予想されます。

☆ 8月下旬に天候不順がある場合は炭そ病、もち病、褐色円星病等の発生が予想されます。

[3 茶芽生育期]

炭そ病、もち病、褐色円星病 発生園

インダーフロアブル[5,000倍・7日]等を散布。8月以降、降雨が続き、病気が見られます。

ハマキムシ類 発生園

防除時期を逃した場合(幼虫体長2cm以上)には**アフーム乳剤**[2,000倍・7日]を散布。

ホコリダニ 発生園 症状は葉裏の褐変・葉表が波打つ(盆過ぎから発生するので注意)

ハチハチ乳剤Ⓜ[1,000倍・14日]を散布。

※ ハチハチ乳剤Ⓜは、ウンカ・スリップス・ホソガにも効果有。

カンザワハダニ 発生園

アグリメックⓂ[1,000倍・7日]又は**ミルベノック乳剤**[1,000倍・7日]等を散布。

※ アグリメックⓂ、ミルベノック乳剤はホコリダニ、サビダニにも登録があります。

クワシロカイガラムシ発生園 防除時期：9月中下旬 , 散布量：1,000ℓ/10a

アプロードエースフロアブル[1,000倍・21日]又は**スプラサイド乳剤**Ⓜ[1,500倍・14日]

※ 防除適期を逃した場合 … **スプラサイド乳剤**Ⓜ + **マシン油(97%)**[100倍] 混用

[秋芽開葉期]

ドイツホルダーA	500倍	炭そ病、もち病、網もち病	混用
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	ウンカ、スリップス、ホソガ、カメムシ	14日

☆秋冬番茶を収穫する場合、安全使用日数等、工場の指示に従って下さい!! ☆

【秋肥】

夏から秋にかけて、茶樹は養分を盛んに吸収して、根や幹を生育・肥大させます。また、この時期の茶樹の生育や養分の蓄積は、翌年の新芽の生育や収量・品質に影響しますので適期に適量施肥することが大切です。施用後は土と混ぜて下さい。

- ・1回目 8月下旬 配合 5袋/10a ※1回目と2回目の施肥は、施用効果を
- ・2回目 9月中旬 配合 5袋/10a 上げるため、10日程度あけて下さい。

栽培・購買のお問合せは美和堂農経済センターへ

電話 (054) 296-2121
 ファックス (054) 296-2125

水稻

- 水管理
 - 穂ばらみ期～出穂期は水を最も必要とする時期なのでたん水状態にする。
 - 出穂後は数日おきに間断かん水とし、落水は出穂後30日頃とする。



- 病害虫防除

薬剤の散布は開花中や高温期（午前8時～午後2時）を避けるようにする

穂いもち・穂枯れ	ブラシン(フ)	1,000倍	収穫7日前	2回
ウンカ・カメムシ	キラップジョーカー(フ)	1,000倍	収穫14日前	2回

- 収穫時期
 - 一穂中の90%の籾が黄金色になった頃（早生品種では出穂後35～40日頃が目安）
 - 8月に入り高温が続いているため高温障害の発生が懸念されます。かけ流しなどの管理を行い、水温管理に注意してください。

カメムシ・ウンカに注意!

カメムシは口針を作物に刺して吸汁するので「しいな粒」や「斑点米」被害が発生します。今年のウンカの発生状況は全国的にやや多い傾向です。

防除のポイント

- ① 畔の除草は出穂14日前までに行なう。
- ② ウンカ類は株元に寄生することが多いため、株元まで薬剤がかかるようにする。
- ③ カメムシは日中あまり活動しないため防除は早朝か夕方に行なう。
- ④ 薬剤の散布適期は出穂7～10日後頃。発生の多い場合には前回散布の1週間後に下記の薬剤で2回目の防除をすると効果的



スタークル(顆水)	2,000倍	収穫7日前	3回
-----------	--------	-------	----

令和2年度 水稻農作業標準料金表(税込)

作業名		単位	料金	備考
刈取	コンバイン	10a	54,450円	刈取・乾燥・籾摺(玄米運搬は含まない)
	バインダー		16,500円	結束ひも代含む
脱穀			14,520円	
乾燥	コンバイン		27,170円	コンバインによる刈取籾
	仕上げ乾燥	5,500円	玄米水分は18%未満とし、それ以上は割増とする	
籾摺		60kg	1,210円	乾燥良く収穫した籾
玄米運搬		10a	2,200円	

野菜(秋冬アブラナ科野菜)

生育初期のコナガ・ヨトウは定植時の粒剤施用で被害を防ぎましょう。

薬剤名	キャベツ	ハクサイ	ダイコン	ブロッコリー
オルトラン(粒)	1～2g/株	1～2g/株	3～4kg/10a	2g/株
プリロツソ(粒)	1～2g/株	1～2g/株	6kg/10a	1～2g/株
プレバソン5(フ)	100倍(灌注) 2,000倍	100倍(灌注) 2,000倍	2,000倍	100倍(灌注) 2,000倍

※プレバソンの灌注はセルトレイまたはペーパーポットのみです。ポリポットへは使用できません。

いちご

炭そ病の発生が多くなってきました。徹底した防除管理をお願いします!!

1. 育苗管理(切離後の管理)

- (1) 育苗時の肥切れは芯止まり、1.5番の発生=収量減少につながります。液肥等を施用し管理しましょう。一度肥切れすると液肥を数回散布しても回復に時間が掛ります。くみあい液肥2号 1,000倍～800倍(窒素レベルにあわせて加減する。)

- (2) 定植7～10日前に弁当肥として液肥を施用する。

参考:くみあい液肥2号(10-5-8)17%アンモニア態N ※水道水EC 0.16の場合

倍率	200mlの窒素量	EC※
800倍	30mg	0.69
1,000倍	24mg	0.53

- (3) 苗質をそろえるため葉かきを行う。特に太郎苗の葉かきは強めに行う。(定植時4～5枚)
- (4) 葉かき作業などは晴天日に行い、その後、必ず炭そ病の予防薬剤を散布する。
- (5) 本圃にハダニ・ウドンコ病を持ち込まないように定植前に複数回農薬を散布する。
- (6) 育苗ローテーション防除(先月の続き) ※切り離し後、使用回数リセットです。

	殺菌剤	RAC	殺虫剤	RAC	対象病害虫
9月1週	ベルコート(フ)	M7	エコピタ	気門	う、炭、灰、ア、コ、ダ
9月2週	アントラコール(顆水)	M3	コテツ(フ)	13	炭、ヨ、ダ、ホ、ス
9月3週	ゲッター(水)	1・10	プレオ(フ)	UN	炭、オ、ヨ

※う=うどんこ病、炭=炭そ病、灰=灰色かび病、ア=アブラムシ、ヨ=ヨトウムシ、オ=オオタバコガ、ダ=ダニ、コ=コナジラミ、ス=スリップス、ホ=ホコリダニ

【要注意!いちごの農薬について】 ※以下の農薬は8月中旬以降、使用に注意して下さい。

収穫前日数が長いもの

ベンレート水和剤(30日前)・ジマンダイセン水和剤(76日前)トクチオン乳剤(75日前)

本圃で天敵の影響日数が長いもの 成分によっては3ヶ月程度影響します。

モベントフロアブル

合成ピレスロイド剤(アーデント・アグロスリン・アディオ・マブリック・ロディー)

有機リ剤(カルホス・スミチオン・マラソン・トクチオン)

カーバメート剤(ランネート・ラービン)

2. 本圃

- (1) 検鏡を必ず行い、適期に定植する。

全体検鏡日程 きらび香:9月16日 紅ほっぺ:9月23日

北部支部日程 9月26・29日 10月1・3日 以降は個別対応(以前も同様)

※サンプルについては美和営農経済センターに前日までに5株程度提出をお願いします。

- (2) 地温が高いと初期の活着が悪くなります。定植前から地温25℃以下(適温20℃前後)になる様に管理して下さい

- (3) 定植時展開葉3～4枚とし、晴天日に定植する。葉かきしながらの定植はしない!

対象病害虫	薬剤名	使用倍率	使用方法	回数	影響
アブラムシ	アドマイヤー1(粒)	0.5g/株	定植時	1	ミツバチ30日 カブリダニ14日
コガネムシ類	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	定植時 土壌混和	1	ミツバチ45日 カブリダニ30日以上
	ダイアジノンSLゾル	25倍	定植前 土壌混和		ミツバチ45日 不明

- (4) 定植後、少なくとも1週間は『手かん水』を徹底して行い初生根の発生を促す。

