



# 長田営農経済センターだより



発行: 令和2年9月20日 電話: 259-3233 Fax: 259-3164

センター長	TAC	青年部	柑橘	苺・水稻・蔬菜	落葉果樹・茶・有害鳥獣	女性部
畑澤	山森	大塚	高橋	山森・大塚	森	山本
購 買						
岡田・石原・岡部・糟屋・田中						

## 購買店営業日時変更について

購買営業時間は上期決算の為、下記の様に変更となります。

9月30日(水) 8:30~12:00

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

## JA静岡市ふれあい座談会

今回、例年開催しているふれあい座談会は、新型コロナウイルス感染防止のため、書面方式(アンケート形式)にすることに致しました。アンケート用紙(別紙)の提出をよろしくお願いいたします。

**提出期限 令和2年10月16日(金)(最寄の支店まで)**

## いちご〔担当: 山森・大塚〕

### 定植後の管理

- 定植後一週間は手灌水を実施し、活着を促進させる。
- 紅ほっぺの葉かきは、定植2週間は行わず発根を促す。
- 春先にうどんこ病が発生した苗は、下記の表を参考に薬剤防除を行う。

### 防除

月	週	殺菌剤	殺虫剤	備考
10月	1	イオウフロアブル (2,000倍-回数なし)	アフーム乳剤 (2,000倍-前日-2回)	うどんこ(予防) ダニ・ヨトウ
	2	ダイマジン (2,000倍-前日-2回)	コテツフロアブル【印】 (2,000倍-前日-2回)	うどんこ ハダニ・スリップス
	3	アフェットフロアブル (2,000倍-前日-3回)	コロマイト水和剤 (2,000倍-前日-2回)	うどんこ ハダニ・うどんこ
	4	ジーファイン水和剤 (1,000倍-前日-回数なし)	サフオイル液剤 ※ (500倍-前日-回数なし)	うどんこ ハダニ
	5	①天敵導入 ②ミツバチ導入 ③ビニール・マルチ被覆		

※ハダニの発生が非常に多い場合には、ダニサラバ、またはスターマイトに変更する。

## 里芋(唐芋)〔担当: 山森・大塚〕

遅い追肥は芋の品質に悪影響が出るので、配合肥料等の施用は控える

病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	前日-2回
ハダニ	コテツフロアブル【印】	2000倍	7日-2回

## 柑橘〔担当: 高橋〕

- ☆ 青島温州の摘果作業(9月中旬~採取まで)、早生ミカン・中晩柑は仕上げ摘果をして下さい。
- ・ 10月上旬までの摘果は糖度を上げる効果があります!
- ・ 粗皮果、大玉果、すそ枝・内なりの小玉果、天成り果(日焼果)、軸太果などの外観不良果の除去
- ☆ 今年は7月に雨が多かったため、内なり果が特に黒点病の被害果が酷く又多いので摘果して下さい。
- ☆ 成木青島ミカン・早生ミカンの夏秋梢は、充実した枝を切らずに来年の結果母子として使いましょう。
- ☆ 成木中晩柑の夏秋梢はカイヨウ病の越冬病斑になるのですべて切除して下さい。
- ☆ 幼木は温州みかん・中晩柑ともに、病虫害無被害の枝を充実した堅いところで切り返して残します。
- ☆ 夏秋梢は再発芽しない10月中旬に切除作業をしてください。

## 防除 …… カメモシの発生に注意\* 圃場で見つけたら即防除!

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
スルガエレガント	10月中旬	ミドリヒメヨコバイ カメモシ類	テルスター水和剤	2000倍	前日-3回
		黒点病・赤さび病	オキシンドー水和剤80	1000倍	60日前-3回
早生温州	収穫7~10日 前混用散布	貯蔵病害 (腐敗防止)	ベンレート水和剤	4000倍	前日-4回
			ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日-3回

## 施肥

作物	使用時期	肥料	10a当たりの施肥量
早生温州	10月下旬	みかん50ペレット	5袋
スルガエレガント	10月下旬	スルガペレット	6袋

## 落葉果樹〔担当: 森〕

### 防除

※ICボルドーは、「412」と「66D」があるので、種類に注意してください。

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
桃	10月中旬	せん孔細菌病	ICボルドー 412	30倍	/
			ムッシュボルドー バイカルティ(混用)	500倍 500倍	
梨	10月上旬	黒星病・黒斑病	キノドーフロアブル	1000倍	3日前-9回
梅	10月~発芽前	かいよう病	ICボルドー 66D	50倍	/
キウイ	収穫直後(レインボー)	かいよう病	コサイド3000	2000倍	

**施肥**

作物	使用時期	肥料	10a 当たりの施肥量
桃	10月上旬	桃秋ペレット	砂質土壌 6 袋
			粘質土壌 3 袋
いちじく	10月中旬	静岡フルーツペレット	4 袋
梨			6 袋
柿・梅			5 袋
キウイ			ハイワード
	レインボー、東京ゴールド	7 袋	
土壌改良材 (柿・梨・梅)	10月中旬	苦土セルカ2号 (配合肥料と同時施用できます)	10袋

**茶** [ 担当：森 ]

**【防除】**

時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準	使用方法
秋整枝後	カンザワハダニ	オマイト乳剤	1500倍	14日-2回	単用

輪斑病・赤焼病の発生が予想される園では、秋整枝直後にカスミンボルドー1000倍(30日)で散布してください。

**【管理】**

**秋整枝について**

時期：平均気温が18～19度以下になった頃(再萌芽を防止するため)

整枝程度：葉層を8cm以上残すようにする

2番茶摘採面より4～5cm程度(三番茶の葉を2～3枚残す)上で整枝して下さい

**水稲** [ 担当：山森・大塚 ]

[水管理] 出穂後30日間は間断灌水を行い、穂を充実させる

収穫時に人や機械が入り易いように水管理をする(乾きすぎに注意する)

[落水適期] 出穂後30日前後だが、高温乾燥が続くようなら走水程度のかん水を行う。

品	種	落水期	収穫期
きぬむすめ		9/20	9/27
あいちのかおり		9/29	10/4
葵美人		10/2	10/7

8月の平均最高気温が高く、生育が早くなっていることがあるので、生育に合わせて作業をする

[収穫] 適期刈り取りの目安 籾が90%黄化した時期

出穂後の日数 早生種(35～40日)、中生種(40～45日)、晩生(45～50日)

[乾燥] 7日程度天日干しを行い、玄米水分を15%に調整する(測定をご希望の方は、事前に営農センターへご連絡ください259-3233)

乾燥機を使用する場合は、急激な乾燥を避ける

[ウンカ] 台風などによりウンカが発生した場合、スタークル顆粒水溶剤(3000倍、7日前-3回)を散布する

～ **お知らせ** ～

**「長田ウォークラリー&長田市(青空市)」を開催いたします。**


▲開催日 令和2年11月3日(火)

▲青空市の参加を募集します。

詳しくは部農会回覧又は長田営農経済センターまで!



**有害鳥獣情報**



- ・9月捕獲実績 ハクビシン1頭(広野)
- ・イノシシ被害報告はありませんが、足跡があるなど活動している様子があります。又ハクビシン等は、活発に活動しています。またサルを目撃情報(向敷地)もありました。
- ・被害が出る前に、電柵・防護柵の点検及び設置をして下さい。
- ・現在 JA より小動物用オリを借りている方は、他にも借りたい方がいますので、必要が無くなりましたら速やかに返却して下さい。オリは協議会でも今後購入に向け調整中です。

**日本農業新聞・家の光・農業経営記録簿の注文受付中!**

- ・長田営農経済センターでは、随時購読の申込みを受け付けています!

**購買店舗からのお知らせ!**

☆部農会回覧 春植え柑橘・榊の苗木注文書(締切日10月30日)

「申し込みが遅れると希望される品種が無くなります」

☆「秋の生活事業展示会開催」婦人服・アクセサリー…他

日時：10月15日(木) 16日(金) 9:00～15:00

場所：JA 静岡市長田支店1・2階特設会場

詳細は別紙チラシをご覧ください。

☆落葉果樹の苗木の配布は、11月下旬～12月上旬になります。

**農地の貸し借りにつき、契約等の希望される方**

果樹園などの農地を貸している方・借りている方、まだ契約等を行っていない場合は、将来の為に

JA静岡市長田営農経済センターへご相談ください。電話:259-3233 担当「高橋」