



長田宮農経済センターだより



発行：令和2年11月11日 電話：259-3233 Fax：259-3164 No.256

センター長 畑澤	TAC 山森	柑橘 高橋	苺・水稻・蔬菜・青年部 山森・大塚	落葉果樹・茶・有害鳥獣 森	女性部 山本
購 買					
岡田・富永・石原・糟屋・田中					

令和2年11月3日に開催した“長田市&ウォークラリー”は、皆様のご協力のおかげで大盛況を収める事ができました！
ご尽力いただき、本当にありがとうございました！



いちご〔担当：山森・大塚〕

〔摘花〕 根張り、葉面積の確保、草勢等バランスを考えて、株に応じて摘花を実施する
(目安) 頂花房 7~10個、腋花房 5~7個

〔ハウス内環境管理〕

- ・日中のハウス内の気温は25℃~27℃が適温 ※できるだけ温度を保てるよう、早めの保温を心掛ける
- ・最低夜温は、紅ほっぺ・章姫は10℃、きらび香は最低夜温12℃を下回ったら保温を開始する
- ・年内の収量を増やすため、12月はできるだけ最低温度を高くするように心がける
※寒さが本格的になる前に、ハウス内の隙間や二重被覆の破れなどを補修しましょう！

〔ミツバチ管理〕

- ◎ミツバチは20~25℃で最も活発に訪花する。
- ・高温になるとハウスの上部を飛び、体力が消耗するためハウス内は30℃以上にならないようにする。
- ・厳寒期は巣箱をハウス内に設置する、または毛布でぐるむ等の保温をする

〔病害虫防除〕

病 害 虫	農 薬 名	倍 率	使用基準	天 敵	ミツバチ
うどんこ病	ベルコートフロアブル	4000倍	前日-5回	影響なし	1日
うどんこ病・灰色かび病	フルピカフロアブル	2000倍	前日-3回		
灰色かび病	スミレックスくん煙顆粒	6g/ 100m ³	前日-3回		
ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1000倍	前日-2回		
	ダニオーテFL※	2000倍	前日-2回		
アブラムシ	ウララDF	2000倍	前日-2回		
アブラムシ・コナジラミ	チェス顆粒水和剤	5000倍	前日-3回		

※ダニオーテFL

☆各種ハダニ類の全ステージに活性を示します

☆本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は銅剤との混用はさけてください。銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください。
銅剤を散布した後の本剤の使用はさけてください。

レ 指導員
おすすめ

タマネギ〔担当：山森・大塚〕



栽培のポイント：肥料過剰と加湿環境に注意！ 腐敗病の原因となる

追肥管理：有機化成10号(10-6-7) 50kg/10a タイミング：①12月中・下旬 ②3月上旬
収穫・貯蔵について：全株の約8割が倒伏した頃。 茎葉が概ね乾いたら風通しの良いところで貯蔵する

病 害 虫	農 薬 名	倍 率	使用基準
腐敗病	バリダシン液剤	500倍	3日-5回
白色疫病	ランマンフロアブル	2000倍	7日-4回
アザミウマ類	ディアナSC	2500倍	前日-2回

水稻〔担当：山森・大塚〕

土づくり資材：ケイ酸を施用し、倒伏防止・食味向上を図る。また、高温障害の軽減も期待できる
下記の3資材の中から1つを施用する。

資材名	施用量(10a)	備考
オイスターミネラル	5袋	カキ殻入りケイ酸質資材
けい酸加里プレミア34	2~3袋	ケイ酸34%加里20%他に微量要素も含有
とれ太郎	3袋	省力的な資材
ワラ分解キング	1袋	年内に稲藁と一緒にすきこむ。浮き藁防止、ケイ酸を戻す

茶〔担当：森〕

【防除】チャトゲコナジラミ

特徴	年3~4回発生(5月・7月・8~9月・10~11月) ※ 繁殖率が高いため、急速に地域全体に拡散します
被害	幼虫の密度が高い(大発生する)と、すそ部に「すす病」(古葉が黒くなる)が生じます
防除	12~2月にかけてトモノールSなど(100倍) ※ 400g/10a 幼虫・卵のいる、すそ葉・葉裏を重点に散布してください。 ※ マシン油を2回散布することで防除効果があがり 2回散布する場合1ヶ月以上間隔をあけてください また、マシン油は水に流されやすいため、晴天が2~3日続くときに散布して下さい ※ 赤焼病が助長される恐れがあります。

【防除】灰色カビ病

- この時期に気温が高く(発病適温15~18℃)、降雨が多いと発生が心配されます。また、着花の多い茶園ほど発生が多くなります。下記の薬剤を散布してください。
開花盛期または落弁期に、フロンサイドSC [2000倍] またはベフドー [500倍]

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。

柑 橘 〔 担当：高橋 〕

*青島温州の収穫・予措 青島ミカンは浮皮になる前に早期収穫をしましょう！



今年の青島みかんは、10月下旬からの少雨乾燥が続き、着色も早く良い品質が期待できます。

貯蔵病害防除後は樹全体の果実が8部着色以上で早期収穫（11月中下旬）をしましょう。

*中晩生柑橘類の水腐れ症は、モイスチャー又はアピオンEで対策をしましょう！

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	倍率	使用基準
温州ミカン類	収穫7日前～前日	貯蔵病害 (混用散布)	ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日-3回
			ベンレート水和剤	4000倍	前日-4回
スルガ(甘夏)	収穫10～20日前	へた落ち防止 貯蔵病害 (混用散布)	マデックEW	3000倍	1回
			ベフラン液剤25【印】	2000倍	前日-2回
ポンカン はるみ 不知火	着色5～6分	水腐れ軽減 (果実散布)	モイスチャー	300倍	2回
			又は アピオンE	500倍	—
柑橘	発生時	ミカンハダニ	カネマイトF	1500倍	7日-1回

②ベフラン液剤は、購入の際印鑑が必要です。

落葉果樹 〔 担当：森 〕

作物	使用時期	病虫害	薬剤名	使用倍数
桃	12月上中旬	越冬害虫 カイガラムシ類・ダニ	マシン油乳剤9.7% (トモノールS)	50倍 (水100ℓに2ℓ)
梨	12月上旬	越冬病害虫		
レインボーレッド、 東京ゴールド	12月上中旬	かいよう病	ICボルドー66D	25～50倍
キウイ		越冬病害虫	マシン油乳剤9.5% (トモノール)	14倍 (水100ℓに約8ℓ)
イチジク		幼木寒害防止 ⇒ 主幹・主枝に藁を巻き保護する さび病、疫病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する。		
柿	12月中下旬	越冬病害虫	マシン油乳剤9.7% (トモノールS)	50倍
		落葉病・うどんこ病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する		
梨・キウイ・柿		越冬病害虫対策	粗皮削り (病虫害の越冬場所となる古い樹皮を削り落とす)	

※多種類の果樹に散布する場合は、マシン油乳剤9.5% (トモノール) を使用する

【マシン油乳剤取扱いの注意点】

- マシン油乳剤は混用時に、油が浮かなくなるまで水と良く混ぜ合わせてください。
- マシン油は、原液に水が少しでも入ると保存できないので、注意してください。

～ お知らせ ～

〈税務関係日程のお知らせ〉

青色専従者相談会

丸子支店 令和3年1月6日(水) 下川原支店 令和3年1月7日(木)
長田支店 令和3年1月8日(金) 時間 9:00～11:00(午前のみ)

持ち物

- 令和2年度源泉徴収簿 ・ 納付キップ ・ 通帳(事業主)・通帳印
 - マイナンバーカード、通知カード (通知カードの場合は身分証明書も必要です)
- ※給料受給者と支払者、両者分ご持参ください。

JA 静岡市アスパラガス生産部会

一緒にアスパラガスを栽培してみませんか♪

JA 静岡市アスパラガス生産部会では、新たにアスパラを栽培してみたい人を募集しております！
「今までアスパラを作ったことない！」という人でも、栽培の基礎から丁寧にフォローさせていただきますので、まずはお気軽に最寄りの営農センターまでお問い合わせ下さい♪



購買からのお知らせ

〈お正月用品受け付け中！〉 申込み締め切り 11月30日(月)
申込み先 長田営農経済センター購買 または 最寄の支店まで

〈農業用塩化ビニール回収のお知らせ〉

日時 12月8日(火) 午前8:30～11:00まで 長田支店 駐車場

長田有害鳥獣協議会 掲示板



- 10月 捕獲報告 イノシシ5頭 (アナグマ3頭)

イノシシが活発に動いており、ミカンなどの食害が報告されています。

- 11月に、猟犬が亡くなる事案が発生しました。有害鳥獣駆除には猟犬を入れるため、万一農薬などがあると、猟犬が口にする場合がありますので、農薬については適正な管理をお願いします。また、絶対に農薬の使用目的以外の使い方はしないようお願いします。