

# 南の風だより

# 11月

南部営農経済センター 静岡市駿河区西大谷5-3  
TEL: 237-5580 FAX: 237-5155

センター長	杉山	購買	後藤・谷米・松風	女性部	横山
TAC	松尾	水稻・野菜・苺	川島・大村	茶・柑橘	繁田
購買地区担当	海野（東豊田・豊田）・栗田（久能・大谷）・末永（高松・大里）		配送員	立花	

## 野菜

### たまねぎ

- ・ 植付の深さは白い部分が出る程度（緑葉部がかくれるほど深植えすると伸びてこない）
- ・ 追肥は12月・2月・3月に行う。※遅い追肥は腐りを増加させるので、3月上旬までに行う。



病害虫名	農薬名	希釈倍数	使用基準
べと病・白色疫病	リドミルゴールドMZ	1000倍	7日-3回
アザミウマ類	ディアナSC	2500~5000倍	前日-2回

**ほうれんそう** ベと病は抵抗性品種を使用し窒素過多、排水不良、密植を避け、風通しをよくする

べと病	アリエッティ水和剤	1500倍	前日-2回
	ランマンフロアブル	2000倍	3日-3回
アザミウマ類 シロオビノメイガ	ルピエー顆粒水和剤	5000倍	前日-2回
ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	1000~2000倍	前日-3回

**こまつな** 白さび病は防除が困難。過繁茂、多湿を避け、発病を認めたら直ちに抜き取り処分する

白さび病	アミスター20フロアブル	2000倍	7日-2回
アブラムシ類	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	3日-2回
コナガ	アフーム乳剤	2000倍	3日-2回

**さやえんどう（スナックエンドウ）**

うどんこ病	ラリー水和剤	4000~8000倍	前日-3回
ナモグリバエ	アディオン乳剤	3000倍	前日-3回

**はくさい** 軟腐病は根元中心に防除を行う

軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	3日-3回
菌核病	ベンレート水和剤	2000~3000倍	7日-2回
菌核病・黒斑病	ロブラール水和剤	1000倍	14日-3回

**非結球あぶらな科葉菜類**

からしな・こまつな・非結球はくさい・タアサイ・たかな・チンゲンサイ・てごろな・のざわな・パクチョイ・みずな・等

白さび病	ランマンフロアブル	2000倍	3日-3回
マハゲリバエ・コナガ	カスケード乳剤	2000倍	7日-2回

## 水稻

1. ケイ酸資材の施用 10aあたり（下記資材いずれかを施用）

珪力燐	6~8袋	ケイカル・リン酸の補給
オイスターミネラル	5袋	カキ殻によりケイ酸の吸収率UP
けい酸加里プレミアム34	2~3袋	ケイ酸、カリの他、苦土、ホウ素、石灰、鉄を含む。施肥量が珪力燐の3分の1で済む。
とれ太郎	3袋	省力型肥料で、リン酸、苦土、ケイ酸、石灰を含む

2. 稲わらすき込みの場合 10aあたり ※水温が高い方が分解されやすいので早めに行う。

石灰窒素	10~20kg	生わらの分解促進、翌年の元肥を減らす ※ 石灰窒素1袋(20kg)に4kgの窒素成分が含まれます。 ※ コシヒカリ・倒伏圃場ではこの方法は適しません。
ワラ分解キング	10kg	稲藁分解促進の微生物資材、散布直後に耕耘する

3. その他の土づくり資材 10aあたり

ようりん	40~80kg	土壌の有効リン酸を高める
苦土重焼りん	20~40kg	
アツミン	30~50kg	リン酸などの肥効を高める

4. ジャンボタニシ対策

- (1) スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）は寒さに弱い。冬起こしを行い、貝を表面に出し、寒さにさらす。その後、出来るだけ細かく耕耘する。
- (2) 稲わらが表面に残っていると貝の越冬場所になるので注意する。

## 茶

【防除】～ 着花多発園は『灰色かび病』にご注意を！！～

秋整枝後	カンザワハダニ	オマイト乳剤	1500倍	14日-2回
11月~12月	灰色かび病	フロンサイドSC	1000倍	14日-1回

- ※ カンザワハダニの防除は、10月の整枝後に防除してない茶園が対象です。
- ※ 灰色かび病は、秋開花して落ちた花に感染し、そこから葉や芽に感染します。この時期に気温が高く、降雨が続く場合は特に注意してください。

## 柿

【防除】

12月（発芽前）	越冬害虫類 カイガラムシ類	マシン油乳剤	50倍	-
----------	------------------	--------	-----	---



## 肥料年間特別予約受付中！

年特肥料予約申し込み、お忘れではありませんか？  
ぜひ、JAの安心・信頼できる肥料をお得な年特で購入してください！

## いちご

### 株の管理

- 摘葉は老化葉の整理を主とし、一度に極端な葉かきはしない。最低5枚は確保する。果実の日当たりを極端に遮る葉や果房に絡まっている葉は、ハサミで切り落とす。
- 頂果房は3分枝⇒10果、2分枝⇒7果を基本とし、株の草勢をみながら調整する。  
※1.5番果房の発生が見られる場合、頂果房と合わせて10果程度とする。

### 1. ハウス内環境管理

- 温度管理：午前27℃ 午後25℃ 厳寒期は低温に遭遇させない。
- 夜間ハウス温度：最低8℃（高設栽培の場合は10℃）
- 二重被覆は隙間のないようにする。
- 暖房：4段サーモ設定温度の例

5:00	7:00	16:00	22:00
10℃	15℃	10℃	8℃



### 2. ミツバチの管理

- 巣箱が冷えるとミツバチが消耗するので防寒対策を行う。巣箱を外に設置している場合は冷たい風が巣門や通気口に直接吹き込まないように注意する。→毛布や発泡スチロールで囲む等。
- エサは11～2月は2週間に1回、3月以降は1週間に1回、1回あたり150～200cc

#### ★ミツバチ専用エサ★

ハニーシラップ（1斗缶）…人工蜜エサ（オリゴ糖）

どれどれのエサ（4ℓ）…ビタミンC・ビーセント入り

- 設置直後ミツバチが巣箱から出ない場合ビーセントルアーやカモンビービー等を吊り下げる。
- ミツバチ用の飲み水を設置する。⇒トレーに井戸水を入れ、巣箱の近くに置く。  
※農薬散布の際は飲み水に農薬が入らないように注意
- 農薬散布はミツバチへの影響日数を目安にし、散布後は良く換気をして、薬剤が乾いてからミツバチを放つ。

### 3. 病害虫防除

	薬剤	倍率	日数	回数	蜜蜂	備考
うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2	○	EBI系統
	ハーモメイト水溶剤	800倍	前日	—	○	
	ショウチノスケ707アブル	2,000倍	前日	2	○	※カビカ&ガッテ
発生が止まらない圃場は4～5日間隔で防除を行う。						
ハダニ	エコピタ液剤	100倍	前日	—	○	気門封鎖剤
	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	2	1日	天敵影響少
アザミウマ	カスケード乳剤	4,000倍	前日	3	1日	IGR系統
	マッチ乳剤	1,000～2,000倍	前日	4	1日	
春先に大発生する前に年内と年明けに防除をしておく。						
ヨトウ	プレバソンフロアブル5	2,000倍	前日	2	1日	残効性
	ハウス内では11月でも発生するので、花を食害されないように注意！					

#### ★ローテーション散布の例

時期	殺菌剤	対象病害	殺虫剤	対象病害
12月2週目	パンチョTF顆粒水和剤 (2000倍-前日-2回)	うどんこ	チェス顆粒水和剤 (5,000倍-前日-3回)	アブラムシ コナジラミ
12月4週目	アフェットフロアブル (2000倍-前日-3回)	うどんこ 灰カビ	マイトコーネ707アブル (1,000倍-前日-2回)	ハダニ ※天敵影響少

## 農業用廃ビニール回収について

- 回収日：令和2年12月8日（火）
- 場所：JA高松支店 駐車場
- 時間：久能地区…8:30～9:30 他地区…9:30～11:00
- ※8月に委託委任状を提出した方が対象です。
- ※回収時の混雑を避けるため、支店別の回収時間をお守りください。  
(支店別の回収時間は、配布しました案内をご確認ください。)
- ※回収時に配布した『産業廃棄物運搬携帯票』の持参および車両への掲示をお願いします。



## JA 静岡市アスパラガス生産部会より

### 一緒にアスパラガスを栽培してみませんか♪

JA 静岡市アスパラガス生産部会では、新たにアスパラを栽培してみたい人を募集しております！

「今までアスパラを作ったことない！」という人でも、栽培の基礎から丁寧にフォローさせていただきますので、まずはお気軽に最寄りの営農センターまでお問い合わせ下さい♪



## お正月用品 ご注文受付中



### 人気商品

- ボイルずわいかニ爪 5,100円
- 静岡牛肩ロースすきやき 4,100円
- かまぼこセット 4,000円

### お買い得3点セット

- ボイルずわいかに爪
  - えびフライ
  - ほたて貝柱
- 通常価格 9,300円

↓  
セット価格 8,100円

### 新商品

- ハンバーグ3種セット 2,200円
- 味付け数の子（黒醤油） 3,500円

申込締切 11/30（月）

チラシは各支店&営農センター窓口にございます。  
是非ご利用ください！！