

東部営農経済センターだより 11月号

JA静岡市東部営農経済センター TEL: 245-7527

ゆが-長	女性部	茶	苺・水稻・蔬菜	果樹	購買
瀧口	大越	深井邦	深井恵・片井	榮	酒井・萩原・瀧田・森川・齋藤

緊急水稻栽培講習会「ウンカの防除、対策」開催のお知らせ

日時：令和2年12月1日（火）13:30～ 会場：あさはた支店2階会議室

参加希望の方は東部営農経済センターまで申込ください。

※コロナ感染症対策のため参加者はマスクの着用をお願いします。

お願い！畑での野焼きをしないで下さい！

警察・消防より、管内での野焼きについて、地域住民より苦情があると連絡がありました。野外焼却（野焼き）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止になっており、地面で直接、穴掘り、ブロック積、ドラム缶などを用いて、廃棄物（農作物残渣）を焼却する事も法律で禁止されています。違反した場合は5年以下の懲役または罰金に処されます。農業を営むためにやむを得ず行われる焼却であっても、違法になります。処理する場合は、指定された焼却場への持ち込み、畑へのすき込み等で対応下さるようお願いいたします。畑へのすき込みの場合は、「微生物資材」を活用すると残差分解が促進されますのでご検討ください。ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

JA静岡市アスパラガス生産部会 ☆会員募集！！☆

一緒にアスパラガスを栽培してみませんか♪

JA静岡市アスパラガス生産部会では、新たにアスパラを栽培してみたい人を募集しております！「今までアスパラを作ったことない！」という人でも、栽培の基礎から丁寧にフォローさせていただきますので、まずはお気軽に最寄りの営農センターまでお問い合わせ下さい♪

購買店からお知らせ

年特肥料の予約申し込みのお願い

組合員の皆様、令和元年度年特肥料の申込頂き誠に有難うございました。また、提出期日がまだの地区の方に置かれましては、ご検討の程宜しくお願い致します。年内は、追加の相談もお受けしますので必要な肥料は、一袋でも多く予約をご利用下さい。



柑橘

今年のみかんの着色は昨年と比べ早く、“青島温州”の収穫は11月中旬頃から始めていると思います。外観については、黒点病が多く、11月上旬頃の巡回の中で、浮きたがりの果実が見受けられましたので浮皮果の発生が懸念されます。果実内容は11月中旬の定点果実分析の結果から糖は昨年並み、酸は昨年より若干高い内容です。

収穫後は腐敗果の発生が予想されますので収穫前の防腐剤散布と予措を十分に行ってから貯蔵をしましょう。また、貯蔵する前に浮皮果と健全果を分けて貯蔵するようにし、1週間に1回は貯蔵庫内の点検をしましょう。

【防除】

品 種	散 布 時 期	対 象 病 害 虫	農 薬 名	倍 率	日 数
温 州	収穫前日まで	貯 蔵 病 害	ベンレート水和剤 ベフラン液剤25(劇)	4,000倍 2,000倍	前日
	収穫終了後	ダニ・カイガラ	マシン油乳剤97%	60倍	—
中晩柑	12月下旬	ハタ落ち防止 貯 蔵 病 害	マ デ ッ ク E W	3,000倍	10日
			ベフラン液剤25(劇)	2,000倍	前日

【防除の注意点】


樹勢回復のためマシン油散布時に尿素500倍（お湯で溶かす）を混用してください。ベフラン液剤とマデックEWを混用する場合は、先にマデックEWを希釈してください。ベフラン液剤とベンレート水和剤を混用する場合は、先にベンレート水和剤を希釈してください。

【収穫の注意点】

果梗枝のコブを残して果実を収穫して下さい。果実から5～10ミリ位のところの果梗枝にコブがあります。このコブを果梗枝に残す事で、翌年の発芽状況が良好になります。軸を長く残したり、斜めにハサミを入れたりすると切り残した軸で他の果実に傷を付ける原因となりますので、軸を残さないように収穫するか、2度切りを行って下さい。

【予措・貯蔵】

予措 期間 1～2週間 3～5%の減量
貯蔵 温度 3～5度 湿度 85%



落葉果樹

【防除】

対象病害虫	散布時期	作物名	使用農薬名	倍数
越冬害虫 (カイガラムシ)	12月上旬	梅 柿	マシン油(97%)	50倍
		キウイ いちじく	マシン油(95%)	14倍

【剪定】11月中旬以降に実施（徒長枝の整理・重なり枝が無いように）あまり強く切りすぎると、翌年に徒長枝の発生が多くなります。また、結果枝に光があたりにくくなり良い果実が出来ませんので注意して下さい。

いちご

気温が低くなり、肌寒い季節になりました。苺の収穫もいよいよとなり、忙しくなってきましたが、体調管理には十分に付けてください。また、葉の展開、果実の着色を促進するためにもハウス内の温度管理を意識して日々の管理を行いましょう！！

1、 株管理

- ① 摘果…頂果房 7～10 果。また、1.5 番が発生している場合は合わせてきつめに行う。
(頂果房と1次腋花房が近接しすぎている場合は合わせて10果程度にしてください。)
- ② 摘葉…一度に1～2枚程度、基本は古葉のみ。(収穫時7枚程度を目安)
- ③ 芽の管理…2芽管理とし、不要なランナーやドロ芽はかきとる。
- ④ 灌水管理…少量多灌水を基本とする。
給液と廃液の確認をして株の状態を常に確認しましょう。
→営農経済センターにて測定しています。適当な容器に入れお持ちください。

2、 ハウス内環境管理

- ① 夜間最低温度は7℃

すさまじい風、吹いていませんか…？
ハウスの気密性を高めましょう！



☆暖房機のセンサー位置の確認を！☆

苺のクラウン部近くに温度センサーが来るようにしましょう。

- ② 4段サーモ利用時

6時～9時	9時～16時	16時～18時	18時～翌6時
10℃	16℃	18℃	7℃



- ③ 日中は25℃～27℃を保つ。夕方温度を保つよう、暖かいうちに、早めに閉める！
- ④ ミツバチの消耗を防ぐため、30℃を超えないように注意する。

3、 病害虫防除

(きらび香は気門封鎖剤を使用すると裂皮が出やすくなります。)

☆スリップス、ハダニは早期の防除を心がけましょう。

☆灰色かび病の発生時には、くん煙剤の使用がおすすめです。(加湿を避けるため)

「ミツバチと天敵に影響の少ない薬剤一覧」

病害虫	RAC	薬剤名	倍率	回数	日数
ハダニ	25B	※ダニコング(フ)	3,000	1	前日
	未	ダニオーテ(フ) ☆新剤☆	2,000	2	前日
アブラムシ コナジラミ	29	ウララDF	2,000～4,000	2	前日
	9B	チェス顆粒水和剤	5,000	3	前日
スリップス	15	マッチ乳剤	1,000～2,000	4	前日
	28	※ベネピアOD	2,000	3	前日
うどんこ病	7	パレード20(フ)	2,000～4,000	3	前日
	7	アフェットフロアブル	2,000	3	前日
	50	プロパティ(フ)	3,000～4,000	3	前日
	U13・9	※ショウチノスケ(フ)	2,000	2	前日

※ダニコングはダニトロンとダブルフェースの成分が含まれます。使用回数に注意！！

※ベネピアODは展着剤の混用は控えてください。(薬害の危険が高まります。)

※ショウチノスケはガッテンとフルピカの成分が含まれます。使用回数に注意！！

水稻

珪酸は稲がもっとも吸収する成分です。倒伏軽減、食味向上、品質UP(乳白米軽減)等が望め、おいしいお米作りには欠かせません。11月～来年の春に施用しましょう。

資材名	施用量/10a	備考
けい酸加里	2～3袋	＜溶性のカリが含まれ、登熟を向上。珪酸も吸収率が高い。＞
オイスターミネラル	5袋	カキ殻で根張りを良くし、吸収性の良いケイ酸が効率的に効く。
ワラ分解キング	1袋	微生物資材で稲ワラの分解を促進する(年内の使用が理想)ガス発生軽減、ワラに含まれるケイ酸を畑へ戻す

※本年は、ウンカにより水稻は、甚大な被害を受けました。次年度の対策として、「ウンカの防除について」講習会を計画しています。(表面参照)昨今のコロナウイルスの影響を考慮し開催しますので事前に申込下さるようお願いいたします。

茶

チャトゲコナジラミ防除

秋・冬の防除をすることにより一番茶時期の発生密度を軽減できます。

すそ刈りをしてからの防除が望ましい。対応策として、

10月下旬から翌年2月までに2回トモノール又はラピサンスプレー75倍を

うね間に沿ってすそ重点で散布する。10a当り/400L

但し、赤焼病の発生を助長する場合がありますので注意する。

【再整枝】

＜時期＞ 年内に行う場合は11月上旬(2月下旬～3月上旬でも結構です。)

＜深さ＞ 秋整枝位置より絶対に深くしない。

＜目的＞ 秋整枝後に発生する遅れ芽や立ち葉など、整枝面から上に出ているものを除去する。

※できるだけ逆刃のナラシ機を使用する



JA静岡市2021 **特選お正月用品**



毎年、ご好評頂いていますお正月用品を本年もご用意致しましたので是非ともご利用頂きます様宜しくお願い致します。

お申込み締切：11月30日(月)

お届け日：12月25日(金)・28日(月)～30日(水) 申し込み時にご希望日をお選びください。

農業機械(トラクター・小型管理機)使用体験会実施のお知らせ

令和3年1月16日(土曜日)午前10時より開催を予定しています。(雨天中止)

実施場所：あさはた遊水地公園横水田圃場(葵区赤松)

※実施に当たっては、アグリスクールの開催と合わせて実施します。